Naamlijst van Nederlandsche Diptera
afgesloten 1 April 1939

door

Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE (Amsterdam).

Als algemeen resultaat mijner in 1887 begonnen studiën omtrent de Nederlandsche Diptera geef ik hier eene Naamlijst der soorten, die tot de Nederlandsche fauna bleken te behooren. Hierbij is natuurlijk gebruik gemaakt van de Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera, door van der Wulp en mij samengesteld en uitgegeven als bijvoegsel van het Tijdschrift v. Entomologie XLI, 1898 en de daarop verschenen supplementen van mijne hand in het Tijdschrift voor Entomologie (suppl. 1 T. v. E. L., 1907 p. 151—195 ; suppl. 2. T. v. E. LIX, 1916 p. 293—320 ; suppl. 3, T. v. E. LXII, 1919 p. 161—195 ; suppl. 4, T. v. E. LXXI, 1928 p. 11—83 ; suppl. 5, LXXVIII, 1935 p. 188—230 ; suppl. 6, T. v. E. LXXXII, 1939 p. 118—135).

Wegens de talrijke naamsveranderingen in deze orde komen de nu gebruikelijke namen niet altijd overeen met de vroeger gebruikte. Deze veranderingen heb ik ten deele hieronder opgegeven (de oude namen tusschen haakjes) ten deele ook, vooral waar het verkeerde determinaties en geschrapte soorten gold, zijn deze bovendien in de betreffende supplementen te vinden. Dit zijn dus niet allen synonymen, wel heb ik sommige nieuwe synonymen ook opgenomen. Op volledigheid maken deze opgaven geen ;aanspraak zoo heb ik de oude genusnamen meermalen niet vermeld, als de soortnamen dezelfde gebleven zijn. De plaats der in de supplementen vermelde soorten is in de registers van de betreffende deelen te vinden. Ook al ter bezuiniging is geen ruimte gelaten voor aanvullingen. Zij, die daarin belangstellen, doen het beste hiervoor hun exemplaar te laten doorschieten.

In mijne supplementen heb ik slechts bij uitzondering nieuwe vindplaatsen aangegeven. Ik vermeld dit, omdat nog onlangs Rector Cremers meende uit het daarin ontbreken van *Volucella zonaria* Poda te moeten opmaken, dat de opgaven in de Nieuwe Naamlijst van 1898 (niet 1928, zooals in het Maandbl. v. h. Natuurhist. Genootschap in Limburg, Afl. 1 van dit jaar, p. 7 staat) de eenige bekende vindplaatsen voor ons land waren.[1]) In mijne zeer uitgebreide collectie, die

[1]) In de N. N. staat deze soort van Leiden, Vogelenzang en Rhede ; Rector Cremers vermeldt haar van Maastricht en Meerssen ; in mijne collectie staat zij van Hilversum, Baarn, Bergen op Zoom, Venlo, Oirschot. De heer Kabos trof haar ook te Amsterdam aan. (Lev. Natuur Dl. 42 1937 p. 73). De larven leven in nesten van Vespa crabro L., maar ook van V. vulgaris L. of germanica F.

ik aan het Zoöl. Museum te Amsterdam geschonken heb, kan men vele soorten nog van talrijke vindplaatsen dan de genoemde vinden, maar een lijst van alle vindplaatsen zou een te kostbare publicatie worden, en bovendien zou dit toch geen beeld geven van de verspreiding in Nederland, daar slechts op weinige plaatsen intensief verzameld is.

In het algemeen heb ik mij nu, wat de namen betreft, bij het door Lindner met veler medewerking uitgegeven groote werk: „Die Fliegen der palaearktischen Region" aangesloten, waarvan nu 125 afleveringen verschenen zijn. Als Nederlandsch heb ik alle binnen onze grenzen aangetroffen soorten beschouwd, alleen heb ik daarbij niet van eenige kritiek willen afzien, en in gevallen van klaarblijkelijk toevalligen aanvoer uit andere gebieden de soorten nog niet als tot onze fauna behoorend aangenomen. Alle kritiek hierbij uit te sluiten is wel gemakkelijk en zeker, maar bevredigt mij en meerdere andere entomologen toch ook niet.

De eerste Naamlijst van Nederlandsche Diptera, samengesteld door Snellen van Vollenhoven en van der Wulp, is opgenomen in de Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland Deel 1 en 2, 1853 ; zij bevatte 694 soorten, in Bouwstoffen, deel 3, 1860 verscheen een Nieuwe Naamlijst, van van der Wulp alleen, met 1379 soorten. In 1898 publiceerden van der Wulp en de Meijere tezamen weer een Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera, waarin 2133 soorten waren vermeld. In de nu van mij verschijnende lijst zijn 3354 soorten opgenomen. Het aantal is 3 minder, dan men naar Suppl. VI verwachten zou, omdat in „Lindner" eenige der vroegere soorten als synonymen zijn bijeengevoegd.

Op sommige punten is onze kennis der Nederlandsche soorten nog steeds onvolledig. Met genoegen vermeld ik, dat Dr. Kruseman, die reeds een deel der Chironomiden bewerkte, van plan is ook de overige, waarvan ook veel door mij verzameld materiaal sinds jaren ongedetermineerd staat, door te werken. Aan de *Heleidae* (*Ceratopogonidae*) ben ik tegenwoordig zelf nog bezig. Dan resten nog de *Lycoriidae*, vooral het groote genus *Lycoria* (*Sciara*) zelf ; de niet galvormende *Cecidomyidae* en enkele groote genera als *Sarcophaga*, waarvan ook mijn materiaal nog niet naar nieuwere gegevens werd bestudeerd. Toch meende ik, dat het zijn nut kan hebben voor belangstellenden het resultaat van dit levenswerk van mij op deze wijze vast te leggen, in de hoop, dat anderen dit zullen willen voortzetten en verder uitbreiden. Zij hebben dan althans een grondslag, die naast de goede buitenlandsche determineerwerken hun van dienst kan zijn.

1a. Phryneidae.
(Rhyphidae).
(Anisopodidae).
Phryne fenestralis Scop.
(Rhyphus) „
—— fuscata F.
—— punctata F.
Mycetobia pallipes Mg.

1b. Petauristidae.
(Trichoceridae).
Petaurista annulata Mg.
(Trichocera).
—— fuscata Mg.
—— (major Edw.).
—— hiemalis de G.
—— maculipennis Mg.
—— parva Mg.
—— regelationis L.
—— rufescens Edw.
—— saltator Harr.
—— (fuscata Mg. Edw.).

3. Thaumaleidae.
(Orphnephilidae).
Thaumalea testacea Ruthe.
(Orphnephila).

4. Bibionidae.
Penthetria holosericea Mg.
Dilophus febrilis L.
—— (vulgaris Mg.).
—— femoratus Mg.
—— humeralis Zett.
Bibio anglicus Verr.
—— clavipes Mg.
—— ferruginatus L.
—— hortulanus L.
—— —— var. marci L.
—— (marci L.).
—— johannis L.
—— lanigerus Mg.
—— —— var. hybridus Hal.
—— (hybridus Hal.).
—— leucopterus Mg.
—— nigriventris Hal.
—— (lacteipennis Zett.).
—— pomonae F.
—— reticulatus Lw.
—— varipes Mg.

5. Scatopsidae.
Scatopse albitarsis Zett.
—— brevicornis Mg.
—— flavicollis Mg.
—— flavocincta Duda.
—— fuscipes Mg.
—— (atrata Say).
—— (flavitarsis Zett. v. d. W.).
—— (leucopeza Mg.).
Scatopse (recurva Lw.).
—— geniculata Zett.
—— incompleta Verr.
—— nigra Mg.
—— (pulicaria Lw.).
—— notata L.
—— picea Mg.
—— (scutellata Lw.).
—— pulicaria Lw.
—— (integra Walk.).
—— subnitens Verr.
—— transversalis Lw.
—— tristis Zett.
Aldrovandriella halterata Say.
Anapausis albohalterata Duda.
—— tenuicauda Duda.
—— (inermis Ruthe).
Aspistes berolinensis Mg.

6. Itonididae.
(Cecidomyidae).
Clinorhyncha crassipes Winn.
—— tanaceti Kieff.
Trotteria galii Rübs.
Lasioptera carophila F. Lw.
—— populnea Wachtl
—— rubi Heeg.
Thomasiella arundinis Schin.
—— flexuosa Winn.
Rhopalomyia baccarum Wachtl
—— millefolii Lw.
—— ptarmicae Vall.
—— tanaceticola Karsch.
Oligotrophus elegans Winn.
—— juniperinus L.
Pemphigocecis ventricolus Rübs.
Rondaniella bursaria Br.
Mikomyia coryli Kieff.
Semudobia betulae Winn.
Iteomyia capreae Winn.
—— —— var. major Kieff.
Janetiella thymi Kieff.
Zygiobia carpini F. Lw.
Craneiobia corni Gir.
—— lawsonianae de Meij.
Mayetiola destructor Say.
Poomyia poae Bosc.
Cystiphora hieracii F. Lw.
—— pilosellae Kieff.
—— sonchi F. Lw.
—— taraxaci Kieff.
Macrolabis corrugans F. Lw.
—— lamii Rübs.
—— lonicerae Rübs.
—— pavida Winn.
—— pilosellae Winn.
—— stellariae Sieb.
Arnoldia cerris Koll.
Geocrypta galii Lw.
Rhabdophaga albipennis Winn.
—— dubia Kieff.

Rhabdophaga exsiccans Rübs.
—— heterobia Lw.
—— jaapi Rübs.
—— karschi Kieff.
—— noduli Rübs.
—— rosaria L.
—— salicis Schrk.
—— terminalis H. Lw.
Helicomyia pierrei Kieff.
—— saliciperda L. Duf.
Hartigiola annulipes Hart.
Didymomyia reaumuriana F. Lw.
Dasyneura acercrispans Kieff.
—— acrophila Winn.
—— affinis Kieff.
—— alni F. Lw.
—— alpestris Kieff.
—— aparines Kieff.
—— auritae Rübs.
—— bergrothiana Mik.
—— brassicae Winn.
—— bryoniae Bché.
—— cardaminis Winn.
—— compositarum Kieff.
—— crataegi Winn.
—— dioicae Rübs.
—— engstfeldi Rübs.
—— epilobii F. Lw.
—— filicina Kieff.
—— flosculorum Kieff.
—— fraxinea Kieff.
—— fraxini Kieff.
—— galeobdolontis Winn.
—— galiicola F. Lw.
—— glechomae L.
—— harrisoni Bagn.
—— hygrophila Mik.
—— hyperici Bremi.
—— ignorata Wachtl.
—— inchbaldiana Mik.
—— iteobia Kieff.
—— jaapiana Rübs.
—— kiefferiana Rübs.
—— lathyricola Rübs.
—— loewiana Rübs.
—— lotharingae Kieff.
—— marginemtorquens Winn.
—— myosotidis Kieff.
—— oxyacanthae Rübs.
—— piri Bché.
—— plicatrix H. Lw.
—— populeti Rübs.
—— pteridicola Kieff.
—— pustulans Rübs.
—— ranunculi Bri.
—— salicariae Kieff.
—— sisymbrii Schrk.
—— subpatula Br.
—— symphyti Rübs.
—— tetensi Rübs.
—— thomasiana Kieff.
Dasyneura tiliamvolvens Rübs.
—— tortrix F. Lw.
—— trifolii F. Lw.
—— tubicola Kieff.
—— ulmariae Bremi.
—— urticae Perr.
—— viciae Kieff.
—— violae F. Lw.
Wachtliella lychnidis Kieff.
—— persicariae L.
—— riparia Winn.
—— rosarum Hardy.
—— stachydis Bremi.
—— thymicola Kieff.
Bayeria capitigena Br.
Jaapiella clethrophila Rübs.
—— genisticola Lw.
—— loticola Rübs.
—— medicaginis Rübs.
—— myrtilli Rübs.
—— thalictri Lw.
—— veronicae Vall.
Lathyromyza schlechtendali Kieff.
Gephyraulus raphanistri Kieff.
Giraudiella inclusa Frauenf.
Schizomyia galiorum Kieff.
Kiefferia pimpinellae F. Lw.
Asphondylia ervi Rübs.
—— mayeri Lieb.
—— pulchripes Kieff.
—— sarothamni Lw.
Ischnonyx pilosa Kieff.
—— verbasci Fall.
Mikiola fagi Hart.
Hormomyia (Trishormomyia) [crassipes Lw.
—— —— producta Mg.
Monarthropalpus buxi Laboulb.
Syndiplosis petioli Kieff.
Anisostephus betulinum Kieff.
Contarinia acerplicans Kieff.
—— aequalis Kieff.
—— anthobia F. Lw.
—— asclepiadis Gir.
—— barbichei Kieff.
—— corylina F. Lw.
—— dipsacearum Rond.
—— jacobaeae H. Lw.
—— loti Deg.
—— medicaginis Kieff.
—— nasturtii Kieff.
—— nicolayi Rübs.
—— pilosellae Kieff.
—— pirivora Ril.
(—— piricola Nördl.).
—— pisi Winn.
—— pisicola de Meij.
—— pulchripes Kieff.
—— ribis Kieff.
—— rubicola Rübs.
—— scoparii Rübs.

Contarinia scrophulariae Kieff.
—— sorbi Kieff.
—— steini Karsch.
—— tiliarum Kieff.
—— torquens de Meij.
—— tritici Kirb.
Diodaulus linariae Winn.
—— traili Kieff.
Thecodiplosis brachyntera Schwag.
Lestodiplosis centralis Winn.
—— fascipennis Winn.
—— (Coprodiplosis) fuscipennis Bché.
—— raphani Barnes.
—— variegata Macq.
Feltiella tetranychi Rübs.
Dyodiplosis arenariae Rübs.
Hygrodiplosis vaccinii Kieff.
Itonida ochracea Winn.
(Cecidomyia).
—— pini de G.
Endopsylla agilis de Meij.
Macrodiplosis dryobia Lw.
—— volvens Kieff.
Plemeliella betulicola Rübs.
Stictodiplosis mosellana Geh.
(—— aurantiaca Wagn.).
Harmandia cavernosa Rübs.
(—— cristata Kieff.).
(—— crumenalis Kieff.).
—— globuli Rübs.
—— tremulae Winn.
(—— löwi Rübs.).
Clinodiplosis invocata Winn.
—— longiventris Kieff. ?
Mycodiplosis coniophaga Winn.
Silvestrina farinicola Barnes.
Massalongia rubra Kieff.
Ametrodiplosis thalictricola Rübs.
Stylodiplosis acetosellae Rübs.
Porricondyla albitarsis Mg.
(Epidosis).
—— analis Winn.
—— argentifera de Meij.
—— dorsalis Winn.
—— nitida v. d. W.
—— venusta Winn.
Coccopsis marginata de Meij.
Colpodia angustipennis Winn.
—— pallidula v. d. W.

Heteropezidae.

Miastor metraloas Mein.

Campylomyzidae.

Rübsaamenia pectoralis Winn.
Pezomyia vanderwulpi de Meij.
(Monardia).
Campylomyza aceris Mg.
—— aequalis Winn.
—— bicolor Mg.
Campylomyza flavida Winn.
—— flavipes Mg.
—— fuscipes Mg.
—— halterata Zett.

Lestremiinae.

Lestremia leucophaea Mg.
Catocha crassitarsis v. d. W.
—— latipes Hal.
Anarete coracina Zett. Endl. de Meij.

7. Lycoriidae.

(Sciaridae).
Phorodonta flavipes Mg.
Trichosia maxima Strobl.
—— modesta Winn.
Plastosciara pictiventris Kieff.
(—— belingi Winn.).
Epidapus atomarius de G.
(Pholeosciara melina Schm.).
Allostoomma subterranea Schm.
Hyperlasion wasmanni Schm.
Bradysia felix Schm.
—— vanderwieli Schm.
Lycoria (Tab. I) analis Egg.
(Sciara)
—— annulata Meig.
(—— autumnalis Winn.).
—— humeralis Zett.
—— longiventris Zett.
—— lutea Mg.
—— pilosa Staeg.
—— ruficauda Mg.
—— thomae L.
—— (Tab. II A) bicolor Mg.
—— —— (rufiventris Macq.).
—— —— brunnipes Mg.
—— —— (umbratica Zett.).
—— —— carbonaria Mg.
—— —— giraudi Egg.
—— —— morio Mg.
—— —— (lugubris Winn.).
—— Tab. II B) nervosa Mg.
—— —— (fucata Mg.).
—— —— (placida Winn.).
—— —— praecox Mg.
—— (Tab. II C) auripila Winn.
—— —— (villica Winn.).
—— —— conspicua Winn.
—— —— modesta Staeg.
—— —— (silvatica Mg.).
—— —— nemoralis Mg.
—— —— (aprilina Mg.)
—— —— nitidicollis Mg.
—— —— (fenestrata Mg.).
—— —— (scatopsoides Mg.).
—— —— nobilis Winn.
—— —— pusilla Mg.
—— —— vitripennis Mg.
—— —— (coracina Zett. Lengersd.)

(Sciara) (quinquelineata Macq.).
—— —— vivida Winn.
—— —— (falsaria Winn.).
—— (Tab. II E) minuta Winn.
Zygoneura sciarina Mg.

8. Fungivoridae.

Symmerus annulata Mg.
(Plesiastina).
Bolitophila glabrata Lw.
—— hybrida Mg.
—— (fusca Mg.).
—— pseudohybrida Landr.
—— rossica Landr.
Bolitophilella cinerea Mg.
—— saundersi Curt.
Diadocidia ferruginosa Mg.
Macrocera angulata Mg.
—— centralis Mg.
—— fasciata Mg.
—— inversa Lw.
—— lutea Mg.
—— phalerata Mg.
—— stigma Curt.
—— stigmoides Edw.
—— tusca Lw.
—— vittata Mg.
Asindulum flavum Winn.
Ceroplatus testaceus Dalm.
Cerotelion lineatus F.
(Ceroplatus).
Apemon marginata Mg.
(Platyura atrata F.).
Zelmira bicolor Macq.
(Platyura).
—— discoloria Mg.
—— (discoloria Mg. + unicolor [Staeg.).
—— fasciata Mg.
—— —— var. tristis Lundstr.
—— flava Macq.
—— macrocera Edw.
—— modesta Winn.
—— nemoralis Mg.
(—— nemoralis Mg. + nana Macq. + cincta Winn. + succincta Mg.
—— nigricauda Strobl.
—— nigricornis F.
(—— infuscata Winn.).
—— ochracea Mg.
(—— humeralis Winn.).
—— semirufa Mg.
(—— concolor v. d. W. + [fulvipes Mg.).
—— zonata Zett.
Mycomyia aestiva v. d. W.
(Sciophila).
—— bicolor Dziedz.
—— cinerascens Macq.
(—— alacris Winn.).
(Sciophila) circumdata Staeg.
—— fimbriata Mg.
—— fissa Lundstr.
—— flava Stann.
—— flavicollis Zett.
—— fuscata Winn.
—— hyalinata Mg.
—— incisurata Zett.
—— limbata Winn.
—— marginata Mg.
(—— punctata Latr.).
—— occultans Winn.
—— ornata Mg.
(—— ornata Mg. + nigricornis [Zett. + tumida Winn.).
—— pulchella Dziedz.
—— tenuis Walk.
(—— apicalis Winn.).
—— trilineata Zett.
—— wankowiczii Dziedz.
—— winnertzi Dziedz.
Neoempheria bimaculata v. Ros.
(Empheria).
—— striata Mg.
Leptomorphus walkeri Curt.
Allocotocera pulchella Curt.
(Boletina silacea v. d. W.).
Polylepta guttiventris Zett.
Neurotelia nemoralis Mg.
(Anaclinia).
Paraneurotelia dispar Winn.
Phthinia humilis Winn.
Sciophila fenestrella Curt.
(Lasiosoma).
—— hirta Mg.
—— lutea Macq.
—— nigronitida Landr.
—— rufa Mg.
Monoclona rufilatera Walk.
(—— halterata Staeg.).
Acnemia nitidicollis Mg.
Azana anomala Staeg.
Speolepta leptogaster Winn.
(Polylepta).
Coelosia tenella Zett.
Synapha vitripennis Mg.
(Empalia).
Boletina basalis Mg.
—— dispecta Dziedz.
—— dubia Mg.
—— gripha Dziedz.
—— griphoides Edw.
—— plana Walk.
—— sciarina Staeg.
—— silvatica Dziedz.
—— trivittata Mg.
Rondaniella variegata Winn.
(Leia).
—— bimaculata Mg.
(Glaphyroptera).
—— fascipennis Mg.

(Glaphyroptera) longiseta Bardrt.
—— picta Mg.
—— subfasciata Mg.
—— winthemi Lehm.
Ectrepesthoneura hirta Winn.
(Tetragoneura).
Tetragoneura sylvatica Curt.
Megophthalmidia crassicornis Curt.
Docosia gilvipes Hal.
—— sciarina Mg.
Anatella ciliata Winn.
—— schmitzi Landr.
—— unguigera Edw.
Exechia bicincta Staeg.
(—— interrupta Zett.).
—— cincta Winn.
—— confinis Winn.
—— contaminata Winn.
—— crucigera Lundstr.
—— dizona Edw.
—— dorsalis Staeg.
—— fimbriata Lundstr.
—— frigida Holmgr.
—— fusca Mg.
(—— lateralis Mg.).
—— indecisa Walk.
(—— tenuicornis v. d. W.).
—— intersecta Mg.
—— leptura Mg.
—— nigrofusca Lundstr.
—— nigroscutellata Landr.
—— pallida Stann.
—— parva Lundstr.
—— pulchella Winn.
—— repanda Joh.
—— rufithorax v. d. W.
—— schummeli Stann.
—— separata Lundstr.
—— spinigera Winn.
—— spinuligera Lundstr.
—— trivittata Staeg.
Rhymosia affinis Winn.
—— bifida Edw.
—— connexa Winn.
—— domestica Mg.
—— fasciata Mg.
—— fenestralis Mg.
—— gracilis Winn.
—— signatipes v. d. W.
—— tarnanii Dziedz.
Allodia alternans Zett.
(Brachycampta).
—— anglofennica Edw.
—— batava Barndr.
—— bicolor Macq.
—— crassicornis Stann.
(—— —— + punctipes Staeg.).
—— flaviventris v. d. W.
—— grata Mg.
—— griseicollis Staeg.
(—— caudata Winn.).
(Brachycampta) lugens Wied.
—— lundstroemi Edw.
—— obscura Winn.
—— ornaticollis Mg.
—— ruficauda v. d. W.
—— ruficornis Mg.
—— sericoma Mg.
(—— amoena Winn.).
—— truncata Edw.
Polyxena bergensis Barndr.
(Cordyla).
—— brevicornis Staeg.
—— crassicornis Mg.
(—— —— + cinerea Zett.).
—— fasciata Mg.
—— fissa Edw.
—— flaviceps Staeg.
—— fusca Latr.
—— murina Winn.
—— parvipalpis Edw.
—— semiflava Staeg.
—— sixi Barndr.
Trichonta atricauda Zett.
—— terminalis Walk.
—— vitta Mg.
(—— submaculata Staeg.).
Phronia basalis Winn.
—— bicolor Dziedz.
—— cinerascens Winn.
(—— truncata Winn.).
—— dubia Dziedz.
—— egregia Dziedz.
—— exigua Zett.
(—— rustica Winn.).
—— flavipes Winn.
—— flavicollis Winn.
—— forcipata Winn.
—— forcipula Winn.
—— mutabilis Dziedz.
—— nitidiventris v. d. W.
(—— vitiosa Winn.).
—— obscura Dziedz.
—— obtusa Winn.
—— praecox Winn.
—— signata Winn.
—— tenuis Winn.
Dynatosoma fuscicorne Mg.
Fungivora bimaculata F.
(Mycetophila).
—— blanda Winn.
—— cingulum Mg.
—— confluens Dziedz.
—— finlandica Edw.
—— formosa Lundstr.
—— fraterna Winn.
—— fungorum de G.
(—— punctata Mg.).
—— guttata Dziedz.
—— lineola Mg.
—— luctuosa Mg.
—— marginata Winn.

(Mycetophila) obscura Dziedz.
—— ocelus Walk.
—— sigillata Dziedz.
—— signata Mg.
—— signatoides Dziedz.
—— sordida v. d. W.
—— spectabilis Winn.
—— stolida Walk.
—— strigata Staeg.
—— stylata Dziedz.
—— trinotata Staeg.
—— unicolor Stann.
—— vittipes Zett.
Zygomyia flaviventris Winn.
—— humeralis Wied.
—— notata Stann.
—— pictipennis Staeg.
—— setosa Barndr.
—— valida Winn.
—— vara Staeg.
Sceptonia concolor Winn.
—— costata v. d. W.
—— fumipes Edw.
—— membranacea Edw.
—— nigra Mg.
Epicypta punctum Stann.
Delopsis aterrima Zett.
—— scatophora Perr.

9. Psychodidae.

Ulomyia fuliginosa Mg.
Pericoma acuminata Strobl.
—— albicornis Tonn.
—— albifacies Tonn.
—— annulata Tonn.
—— auriculata Hal.
—— canescens Mg.
—— compta Eat.
—— extricata Eat.
—— fratercula Eat.
—— mutua Eat.
—— notabilis Eat.
—— nubila Mg.
—— palustris Mg.
—— trivialis Eat.
Clytocerus ocellaris Mg.
Telmatoscopus albomaculatus Wahlgr.
—— caliginosus Eat.
—— consors Eat.
—— fallax Eat.
—— longicornis Tonn.
—— morulus Eat.
—— rothschildi Eat.
—— similis Tonn.
—— soleatus Walk.
—— ustulatus Walk.
Psychoda albipennis Zett.
—— alternata Say.
—— (sexpunctata Curt.).
—— compar Eat.
—— erminea Eat.
Psychoda grisescens Tonn.
—— humeralis Mg.
—— phalaenoides Zett.
Trichomyia urbica Curt.

10. Liriopidae.

(Ptychopteridae).
Liriope albimana F.
—— contaminata L.
—— (Paraptychoptera) lacustris Mg.
—— minuta Tonn.
—— (Paraptychoptera) paludosa Mg.

11. Dixidae.

Dixa (Dixa) puberula Lw.
—— (Paradixa) aestivalis Mg.
—— —— amphibia Deg.
—— —— nigra Staeg.
—— —— serotina Wied.

12. Culicidae.

Mochlonyx culiciformis Deg.
Chaoborus crystallinus Deg.
—— (plumicornis F.)
—— (fuscus Staeg.)
—— obscuripes v. d. W.
—— (fuscus Staeg. de Meij).
—— pallidus F.
Anopheles (Anopheles) bifurcatus Mg.
—— —— maculipennis Mg.
—— —— —— var. atroparvus [v. Thiel.
—— —— —— messeae Falleroni.
—— —— nigripes Staeg.
Mansonia richiardii Fic.
Theobaldia annulata Schr.
—— fumipennis Steph.
—— (theobaldi de Meij.).
—— morsitans Theob.
Aedes (Aedes) cinereus Mg.
—— (Ochlerotatus) cantans Mg.
—— —— diversus Theob.
—— —— dorsalis Mg.
—— —— leucomelas Mg.
—— —— nemorosus Mg.
—— —— ornatus Mg.
—— —— (geniculatus Ol. ap. Edw.).
—— —— (lateralis Mg. ap. Theob.)
—— —— punctor Kirby.
—— —— quartus Mart.
—— —— (annulipes Mg.)
—— —— sticticus Mg.
Culex pipiens L.

13a. Heleidae.

(Ceratopogoninae)
Forcipomyia bipunctata L.
—— brevipennis Macq.
—— ciliata Winn.
(—— boleti Kieff.)

Forcipomyia frutetorum Winn.
—— murina Winn.
—— nigra Winn.
——picea Winn.
(—— latipalpis Kieff.)
Atrichopogon (Atrichopogon) [minutus Mg.
—— —— rostratus Winn.
—— (Kempia) brunnipes Mg.
—— —— fuscus Mg.
—— —— pavidus Winn.
Dasyhelea (Prokempia) scutellata [Mg.
—— (Dasyhelea) dufouri Laboulb.
—— —— sericata Winn.
—— —— versicolor Winn.
Culicoides arcuatus Winn.
—— fascipennis Staeg.
—— impunctatus Gtgh.
—— minutissimus Zett.
(—— pumilus Winn.).
—— nubeculosus Mg.
—— obsoletus Mg.
—— pictipennis Staeg.
—— pulicaris L.
—— punctidorsum Kieff.
Helea (Helea) crassinervis Gtgh.
Monohelea (Schizohelea) leucopeza [Mg.
Stilobezzia (Stilobezzia) flavirostris [Winn.
—— (Neostilobezzia) gracilis Hal.
(—— —— —— pseudochraceus [Gtgh. i. litt.).
Clinohelea unimaculata Macq.
Johannsenomyia nitida Macq.
Sphaeromias candidatus Lw.
—— fasciatus Mg.
Serromyia femorata Mg.
Palpomyia flavipes Mg.
—— fulva Macq.
—— lineata Mg.
—— spinipes Mg.
Bezzia bicolor Mg.
—— flavicornis Staeg.
—— gracilis Winn.
—— ornata Mg.
—— rubiginosa Winn.
—— solstitialis Winn.
Dicrobezzia venusta Mg.

13b. Tendipedidae.

(Chironomidae).
Graceus ambiguus v. d. W.
Paratendipes albimanus Mg.
—— albitibia Kieff.
—— nubilus Mg.
—— nudisquama Edw.
Polypedilum acutum Kieff.
—— arundinati Gtgh.
—— convictum Walk.
(Polypedilum blandus v. d. W.).
—— fulvonervosum Staeg. Edw.
—— laetum Mg.
—— leucopus Mg.
—— nubeculosum Mg.
—— pedestre Mg.
—— scalaenum Schrank.
—— —— var. trinotatum v. d. W.
Lauterborniella agrayloides Kieff.
—— orophila Edw.
Zavreliella marmorata v. d. W.
Stenochironomus gibbus F.
(—— flexilis auct.)
—— —— var. occultus Kieff.
—— tubanticus Krus.
Stictochironomus histrio F.
—— pictulus Mg.
Microtendipes chloris Mg.
—— pedellus de G.
Endochironomus albipennis Mg.
—— dispar Mg.
—— impar Walk.
—— intextus Walk.
—— lepidus Mg.
—— tendens F.
Glyptotendipes annulimanus Gtgh.
—— barbipes Staeg.
—— —— var. staegeri Krus.
—— caulicola Kieff.
—— foliicola Kieff.
—— gripekoveni Kieff.
—— —— var. gracilis Kieff.
—— imbecillis Walk.
—— mancunianus Edw.
—— pallens Mg.
—— —— —— var. glaucus M.
—— —— —— f. pallipes Krus.
—— paripes Edw.
(—— niveipennis ap. v. d. W. O.a.).
—— —— var. alobulatus Krus.
—— —— var. flavipes Krus.
—— severini Gtgh.
—— viridis Macq.
Kloosia pusilla L., v. d. W.
Demeijerea rufipes L.
Tendipes annularius de G.
(Chrironomus).
—— aprilinus Mg.
—— cingulatus Mg.
—— —— var. rusticus Mg.
—— —— var. nigricans Gtgh.
—— —— var. longistylis Gtgh.
—— —— var. venustus Zett.
—— dorsalis Mg.
(—— riparius Gtgh. nec Edw.).
—— frisianus Kieff.
—— obtusidens Gtgh.
—— pilicornis F.
—— plumosus L.
—— —— var. grandis Mg.
—— —— var. flaveolus Mg.

(Chironomus plumosus [ferrugineovittatus Zett.).
—— —— var. prasinus Mg.
—— pseudovulpes Krus.
—— thummi Kieff.
(—— riparius Edw. nec Gtgh. var. [thummi Kieff.)
(—— sordidatus Kieff.).
(—— flaveolus v. d. W. nec Mg.)
(—— —— var. tricolor Gtgh.)
—— —— var. grisescens Gtgh.).
(—— —— riparius Edw. nec. Gtgh.)
—— triseta Kieff.
—— viridicollis v. d. W.
—— vulpes Kieff.
—— (Einfeldia) dissidens Walk.
—— —— longipes Staeg.
(—— —— tricolor v. d. W.)
—— —— paganus Mg.
(—— —— latidens Gtgh.)
—— (Camptochironomus) [pallidivittatus Mall.
—— —— tentans F.
—— (Limnochironomus) lobiger [Kieff.
—— —— nervosus Staeg.
(—— —— brevitibialis Zett.).
—— —— notatus Mg.
—— —— —— var. rufolineatus [Gtgh.
—— —— pulsus Walk.
—— —— tritomus Kieff.
—— (Xenochironomus) xenolabis [Kieff.
—— (Paracladopelma) camptolabis [Kieff. Edw.
—— (Cryptochironomus) albofasciatus Staeg.
—— —— defectus Kieff.
—— —— psittacinus Mg.
—— —— redekei Krus.
—— —— rostratus Kieff.
—— —— supplicans Mg.
—— —— —— var. obreptans [Walk. Edw.
—— —— vulneratus Zett.
—— (Parachironomus) arcuatus [Gtgh.
—— —— baciliger Kieff.
—— —— biannulatus Staeg.
—— —— demeyerei Krus.
—— —— edwardsi Krus.
—— —— longiforceps Kieff.
—— —— major Gtgh.
—— —— mauricii Krus.
—— —— monochromus v. d. W.
—— —— monotomus Kieff.
(—— —— prasinatus ap. v. d. W.).
—— —— nigronitens Edw.
—— —— parilis Walk.
—— —— pseudotener Gtgh.
(Chrironomus) (Parachironomus) [swammerdami Krus.
—— —— tener Kieff.
—— —— varus Gtgh.
—— —— vitiosus Gtgh.
—— (Harnischia) pseudosimplex [Gtgh.
—— —— virescens Mg.
—— —— viridulus F.
Pseudochironomus prasinatus Stgr.
Kiefferulus tendipediformis Gtgh.
Phaenopsectra albiventer Gtgh.
—— ellipsoidalis Kieff.
—— flavipes Mg.
—— punctipes Wied.
Pentapedilum iridis Kieff.
—— longiseta Kieff. Gtgh.
—— sordens v. d. W.
—— stratiotale Kieff.
—— tritum Walk.
—— uncinatum Gtgh.
Micropsectra fusca Mg.
—— praecox Mg.
(—— gmundensis Egg.).
—— quinaria Kieff.
—— (Xenotanytarsus) miriforceps [Kieff.
—— (Calopsectra) gregarius Kieff.
—— (Rheotanytarsus) photophilus [Gtgh.
Stempellina (saltuum-groep) minor [Edw.
—— (bausei-groep) paludosa Gtgh.
Eurycnemus crassipes Panz.
(—— elegans Mg.)
Metriocnemus albolineatus Mg.
—— fuscipes Mg.
—— incomptus Zett.
—— martinii Thm.
—— nanus Mg.
—— ochraceus v. d. W.
—— pallidulus Mg.
Cricotopus annulipes Mg.
—— bicinctus Mg.
—— brevipalpis Kieff.
—— motitator L.
—— obnixus Walk.
(Orthocladius nigriventris v. d. W.).
—— ornatus Mg.
—— oscillator Mg.
—— sylvestris F.
—— tibialis Mg.
—— tricinctus Mg.
—— unifasciatus Macq.
(—— ? albiforceps Kieff.)
Psectrocladius dilatatus v. d. W.
—— sordidellus Zett.
Orthocladius albinervis v. d. W.
—— diversus v. d. W.
—— ictericus Mg.
—— pygmaeus Mg.

Orthocladius stercorarius de G. ap. [v. d. W.
—— thoracicus Mg.
Eukieferiella bicolor Zett.
(Orthocladius nanulus v. d. W.)
Limnophyes minimus Mg.
Smittia (Smittia) aterrima Mg.
—— —— nudipennis Gtgh.
—— (Camptocladius) stercorarius [de G.
(—— —— byssinus Schrk. ap Gtgh.).
—— (Pseudosmittia) brevifurcata [Edw.
Corynoneura cariana Edw.
—— pumila v. d. W.
—— scutellata Winn.
Prodiamesa olivacea Mg.
(—— notata Staeg. in N.N.)
(—— praecox Kieff.)
Diamesa gaedii Mg.
Protenthes punctipennis Mg.
Procladius rufovittatus v. d. W.
Trichotanypus choreus Mg.
—— culiciformis L.
—— signatus Zett.
Clinotanypus nervosus Mg.
Anatopynia plumipes Fries.
Psectrotanypus ornatus Mg.
—— varius F.
Macropelopia nebulosa Mg.
—— punctata F.
Pentaneura cingulata Walk.
(Pelopia)
(Tanypus)
—— elegantula v. d. W.
—— ferrugineicollis Mg.
—— griseipennis v. d. W.
—— guttipennis v. d. W.
—— melanops Mg.
—— melanurus Mg.
—— monilis L.
—— nubila Mg.
(—— carnea F.)
Hydrobaenus lugubris Fries.
Macropeza albitarsis Mg.

14. Melusinidae.

(Simuliidae).
Melusina argyreata Mg.
(Simulium)
(—— nana Zett.)
—— aurea Fries.
(—— latipes Mg.)
—— maculata Mg.
—— ornata Mg.
—— reptans L.

15. Tipulidae.

Dictenidia bimaculata L.
Xiphura atrata L.
—— —— var. ruficornis Mg.
Flabellifera elegans Mg.
(Ctenophora)
—— festiva Mg.
—— flaveolata F.
—— guttata Mg.
—— ornata Mg.
—— pectinicornis L.
Pales dorsalis F.
(Nephrotoma).
Pachyrhina analis Schumm.
—— cornicina L.
—— crocata L.
—— guestfalica Westh.
—— lineata Scop.
—— (histrio F.).
—— lunulicornis Schumm.
—— maculata Mg.
(——maculosa Mg.)
—— pratensis L.
—— quadrifaria Mg.
—— scalaris Mg.
—— (imperialis Mg.)
—— (flavipalpis Mg.)
—— scurra Mg.
Tipula cava Ried.
—— czizeki de Jong.
—— caesia Schumm.
—— fascipennis Mg.
—— flavolineata Mg.
—— fulvipennis De G.
—— helvola Lw.
—— hortensis Mg.
—— hortulana Mg.
—— irrorata Macq.
—— juncea Mg.
(—— nodicornis Mg.)
—— lateralis Mg.
—— livida Mg.
—— lunata L.
(—— ochracea Mg.)
—— luteipennis Mg.
—— marginata Mg.
—— marmorata Mg.
(—— anonyma Bergr. v. d. W.
(—— confusa v. d. W.)
—— maxima Poda
(—— gigantea Schrk.)
—— melanoceros Schumm.
—— nigra L.
—— obsoleta Mg.
(—— marmorata Mg. v. d. W.).
—— oleracea L.
—— pabulina Mg.
—— pagana Mg.
—— paludosa Mg.
—— peliostigma Schumm.
—— pruinosa Mg.
—— quadrivittata Staeg.
—— rufina Mg.
—— scripta Mg.
—— selene Mg.

Tipula staegeri Niels.
(—— signata Staeg.)
—— truncorum Mg.
—— unca Wied.
(—— longicornis Schumm.)
—— variicornis Schumm.
(Pachyrrhina annulicornis Mg.).
—— variipennis Mg.
—— vernalis Mg.
—— vittata Mg.
Prionocera turcica F.
(Tipula diana Mg.)
Dolichopeza albipes Ström.
(—— sylvicola Curt.)

16. Limoniidae.

(Limnobiidae).
Dicranomyia autumnalis Staeg.
(Limnobia).
—— chorea Wied.
—— —— var. lutea Mg.
—— complicata de Meij.
—— danica Ktze.
—— didyma Mg.
—— distendens Lundstr.
—— dumetorum Mg.
—— frontalis Staeg.
(—— ostensackeni Westh.)
—— lucida de Meij.
—— mitis Mg.
—— —— var. lutea Lacksch.
—— modesta Wied.
—— morio F.
—— omissinervis de Meij.
—— ornata Mg.
—— pilipennis Egg.
—— sera Walk.
(—— forcipula de Meij.)
—— tristis Schumm.
—— ventralis Schumm.
Rhipidia ctenophora Lw.
—— maculata Mg.
—— uniseriata Schin.
Limonia bifasciata Schrk.
(Limnobia).
—— dilutior Edw.
—— flavipes F.
—— hercegovinae Strobl.
—— macrostigma Schumm.
—— nigropunctata Schumm.
—— nubeculosa Mg.
—— quadrinotata Mg.
—— stigma Mg.
—— tripunctata F.
—— trivittata Schumm.
Megarhina flava Walk.
(Rhamphidia)
(Helius)
—— longirostris Wied.
Dicranoptycha fuscescens Schumm.
Antocha vitripennis Mg.
Ormosia bicornis de Meij.
(Rhypholophus)
—— fascipennis Zett.
(—— pentagonalis Lw.)
—— hederae Curt.
—— lineata Mg.
—— nodulosa Macq.
—— pseudosimilis Lundstr.
—— uncinata de Meij.
Rhypholophus bivittatus Lw.
—— varius Mg.
Molophilus appendiculatus Staeg.
—— armatus de Meij.
—— bihamatus de Meij.
—— cinereifrons de Meij.
—— corniger de Meij.
—— flavus Goetgh.
—— gladius de, Meij.
—— griseus Mg.
(—— bifilatus Verr.)
—— medius de Meij.
—— murinus Mg.
—— obscurus Mg.
—— occultus de Meij.
—— ochraceus Mg.
(—— crassipygus de Meij.)
—— pleuralis de Meij.
(—— crassipes Curt. ?)
(—— ochraceus Mg. de Meij. 1918).
—— propinquus Egg.
Ilisia areolata Siebke.
(Acyphona)
—— maculata Mg.
—— vicina Tonn.
Polymeda flavescens L.
(Erioptera)
—— fuscipennis Mg.
—— griseipennis Mg.
—— lutea Mg.
—— macrophthalma Lw.
—— meyerei Edw.
—— minor Edw.
—— nielseni de Meij.
—— squalida Lw.
—— trivialis Mg.
(—— cinerascens Mg.)
Cheilotrichia imbuta Mg.
Trimicra pilipes F.
Chionea lutescens Dalm.
Helobia hybrida Mg.
(Symplecta punctipennis Mg.)
Symplectomorpha stictica Mg.
Gnophomyia viridipennis Gimm.
Gonomyia abbreviata Lw.
—— alboscutellata v. Ros.
—— dentata de Meij.
—— lateralis Macq.
—— lucidula de Meij.
—— tenella Mg.
Rhabdomastix laeta Lw.
Empeda flava Schumm.

Empeda nubila Schumm.
Lipsothrix remota Walk.
Adelphomyia senilis Hal.
—— —— var. fuscula Lw.
Epiphragma ocellaris L.
Idioptera fasciata L.
—— pulchella Mg.
Ephelia dahlei Edw.
—— marmorata Mg.
Poecilostola pictipennis Mg.
—— —— var. angustipennis Mg.
—— punctata Schrk.
Eutonia barbipes Mg.
Limnophila abdominalis Zett.
—— aperta Verr.
—— dimidiata de Meij.
—— discicollis Mg.
—— dispar Mg.
—— ferruginea Mg.
—— filata Walk.
—— fulvonervosa Schumm.
—— fuscipennis Mg.
—— leucophaea Mg.
—— lineola Mg.
—— lucorum Mg.
—— nemoralis Mg.
—— ochracea Mg.
—— phaeostigma Schumm.
—— punctum Mg.
—— sepium Verr.
—— squalens Zett.
—— subtincta Zett.
Crypteria carteri Tonn.
—— placida Mg.
Hexatoma nubeculosa Mg.
(Anisomera)
—— saxonum Lw.
Tricyphona immaculata Mg.
—— littoralis Mg.
(—— tipulina Egg.)
—— schummeli Edw.
—— unicolor Schumm.
Pedicia rivosa L.
Ula macroptera Macq.
(—— pilosa Schumm.).
Dicranota bimaculata Schumm.
—— longitarsis Bergr.
—— subtilis Lw.

17. Cylindrotomidae.

Triogma trisulcata Schumm.
Liogma glabrata Mg.
Cylindrotoma distinctissima Mg.
Phalacrocera replicata L.

18. Stratiomyidae.

Pachygaster atra Panz.
—— leachi Curt.
—— minutissima Zett.
Potamida ephippium F.
(Ephippium thoracicum Latr.)
Nemotelus nigrinus Fall.
—— notatus Zett.
—— pantherinus L.
—— uliginosus L.
Hermione formosa Wied. ap. Mg.
(Oxycera).
—— leonina Panz.
—— pardalina Mg.
—— pulchella Mg.
—— trilineata F.
Stratiomyia chamaeleon de G.
—— furcata F.
—— longicornis Scop.
(Hirtea longicornis Scop.).
—— potamida Mg.
Eulalia argentata F.
(Odontomyia).
—— hydroleon L.
—— —— angulata Panz.
—— ornata Mg.
—— tigrina F.
Hoplodonta viridula F.
Geosargus bipunctatus Scop.
(Sargus).
—— cuprarius L.
—— iridatus Scop.
(—— infuscatus Mg.).
—— splendens flavipes Mg.
Chloromyia formosa Scop.
Microchrysa cyaneiventris Zett.
—— flavicornis Mg.
—— polita L.
Beris chalybeata Forst.
—— clavipes L.
—— morrisi Dale.
—— vallata Forst.
Chlorisops tibialis Mg.
Solva marginata Mg.
(Xylomyia).

19. Tabanidae.

Chrysops coecutiens L.
—— quadratus Mg.
—— sepulcralis F.
—— rufipes Mg.
—— relictus Mg.
Heptatoma pellucens F.
(Hexatoma).
Chrysozona crassicornis Wahlb.
(Haematopota).
—— italica Mg.
—— pluvialis L.
Therioplectes luridus Fall.
—— micans Mg.
—— montanus Mg.
(—— borealis Lw. de Meij.).
—— solstitialis Schin.
—— tropicus Panz.
Ochrops fulvus Mg.
—— latistriatus Brau.

Ochrops plebeius Fall.
—— rusticus L.
Atylotus gigas Herbst.
Tabanus autumnalis L.
—— bovinus Lw.
—— bromius L.
—— cordiger Mg.
—— maculicornis Zett.
—— sudeticus Zell.

20. Rhagionidae.

(Leptidae).
Erinna atra Mg.
Coenomyia ferruginea Scop.
Atherix crassipes Mg.
—— ibis F.
—— marginata F.
Rhagio immaculatus Mg.
(Leptis).
—— lineola F.
—— notatus Mg.
—— scolopaceus L.
—— strigosus Mg.
—— tringarius L.
—— vitripennis Mg.
Chrysopilus auratus F.
(—— atratus F.).
—— aureus Mg.
(—— diadema L.).
—— flaveolus Mg.
—— luteolus Fall.
—— splendidus Mg.
(—— nigritus F.).
Symphoromyia immaculata Mg.
Ptiolina nigrina Wahlb.

21. Cyrtidae.

Oncodes gibbosus L.
—— zonatus Er.
Paracrocera orbiculus F.
(Acrocera).

24. Asilidae.

Leptogaster cylindrica de G.
—— guttiventris Zett.
Rhadiurgus variabilis Zett.
Pamponerus germanicus L.
Asilus crabroniformis L.
Neoitamus cothurnatus Mg.
—— cyanurus Lw.
Neomochtherus pallipes Mg.
Philonicus albiceps Mg.
Protophanes punctatus Mg.
(—— puntipennis Mg.).
Cerdistus geniculatus Mg.
Dysmachus picipes Mg.
(—— forcipula Zell.).
—— trigonus Mg.
Eutolmus rufibarbis Mg.
Antipalus varipes Mg.
Machimus arthriticus Zell.
—— atricapillus Fall.
—— cingulatus F.
—— rusticus Mg.
—— setosulus Zell.
Laphria flava L.
—— gilva L.
—— marginata L.
Lasiopogon cinctus F.
Dioctria atricapilla Mg.
—— baumhaueri Mg.
—— bicincta Mg.
—— cothurnata Mg.
(—— reinhardi Wied.).
—— hyalipennis F.
(—— flavipes Mg.).
—— lateralis F.
—— longicornis Mg.
—— oelandica L.
—— rufipes de G.
Dasypogon teutonus L.

25. Bombyliidae.

Exoprosopa capucina F.
Argyramoeba anthrax Schr.
Hemipenthes morio L.
Anthrax afer F.
—— circumdatus Mg.
—— fenestratus Fall.
—— hottentottus L.
—— paniscus Rossi.
Glabellula arctica Zett.
Bombylius canescens Mikan.
—— cinerascens Mikan.
—— discolor Mikan.
—— major L.
—— venosus Mikan.
—— vulpinus Wied.
(—— fugax Wied. Mg.).
Systoechus sulphureus Mikan.
Phthiria pulicaria Mikan.

26. Therevidae.

Tabuda anilis F.
Psilocephala ardea F.
Thereva annulata F.
—— bipunctata Mg.
—— fulva Mg.
—— nobilitata F.
—— plebeia L.
—— subfasciata Schumm.

27. Omphralidae.

(Scenopinidae).
Omphrale fenestralis L.
(Scenopinus).

28. Empididae.

Meghyperus sudeticus Lw.

Hybos culiciformis F.
—— femoratus Müll.
(—— fumipennis Mg.).
—— grossipes L.
Syndyas nigripes Zett.
Syneches muscarius F.
Bicellaria intermedia Lundb.
—— simplicipes Zett.
—— nigra Mg.
—— pilosa Lundb.
—— simplicipes Zett.
(—— melaena Hal.).
—— spuria Fall.
Rhamphomyia aethiops Zett.
—— atra Mg.
—— barbata Mg.
(—— pennata Mg.).
—— cinerascens Mg.
—— crassicauda Strobl.
—— erythrophthalma Mg.
(—— serotina Oldbg.).
(—— serotina de Meij.).
—— filata Zett.
—— flava Fall.
—— geniculata Mg.
(—— plumipes Fall. Lundb.).
—— gibba Fall.
—— laevipes Fall.
(—— conformis Kow.).
—— nigripennis F.
—— nigripes F.
—— niveipennis Zett.
—— platyptera Panz.
—— simplex Zett.
—— spinipes Fall.
—— stigmosa Macq.
—— sulcata Mg. Collin.
(—— propinqua de Meij.).
—— sulcatella Collin.
(—— sulcata Mg. de Meij.).
—— tarsata Zett.
—— variabilis Fall.
Empis albinervis Mg.
—— albopilosa de Meij.
—— digramma Mg.
(—— bilineata Lw.).
—— borealis L.
—— caudatula Lw.
—— chioptera Fall.
—— ciliata F.
—— cinerea Zett.
—— decora Lw.
(—— dasythrix de Meij.).
—— femorata F.
—— grisea Fall.
—— livida L.
—— lutea Mg.
—— meridionalis Mg.
—— nitida Mg.
—— nuntia Mg.
(—— pennaria Fall.).
Empis opaca Mg.
—— parvula Egg.
—— pennaria Fall.
(—— vernalis Mg.).
—— pennipes L.
—— picipes Mg.
(—— brevicornis Lw.).
—— plumipes Zett.
(—— decora Lw. Lundb.).
—— prodromus Lw.
—— pulicaria L.
—— punctata Mg.
—— serotina Lw.
—— stercorea L.
—— tessellata F.
—— trigramma Mg.
—— variegata Mg.
—— vitripennis Mg.
Hilara argyrosoma Strobl.
—— canescens Zett.
—— chorica Fall.
—— cilipes Mg.
—— cinereomicans Strobl.
—— cingulata Dahlb.
—— clypeata Mg.
—— cornicula Mg.
—— flavipes Mg.
—— fuscipes F.
(—— carinthiaca Strobl.).
—— gallica Fall.
—— griseola Zett. var. nigritarsis [Zett.
—— hirta Strobl.
—— interstincta Fall.
—— lasiochira Strobl.
—— litorea Fall.
—— lundbecki Mg.
—— lurida Fall.
—— maura F.
—— minuta Zett.
—— nigrina Fall.
—— nigrocincta de Meij.
—— paeudochorica Strobl.
—— pubipes Lw.
—— quadrifaria Strobl.
—— spinimana Zett. var. [spinigera Str.
—— tenella Fall.
—— tetragramma Lw.
—— thoracica Macq.
Oedalea flavipes Zett.
—— hybotina Fall.
—— pallipes Zett.
Trichina clavipes Mg.
Microphorus anomalus Mg.
—— holosericeus Mg.
(—— velutinus Macq.).
Ocydromia glabricula Zett.
Leptopeza flavipes Mg.
—— sphenoptera Lw.
Euthyneura myricae Hal.

(Anthalia rostrata Zett.).
Wiedemannia bistigma Curt.
Hydrodromia stagnalis Hal.
Hemerodromia oratoria Fall.
—— raptoria Mg.
—— stigmatica Schin.
—— unilineata Zett.
Chelifera flavella Zett.
—— (melanocephala Hal.).
—— precatoria Fall.
Dolichocephala irrorata Fall.
—— novemguttata Strobl.
Trichopeza longicornis Mg.
Phyllodromia melanocephala F.
(Lepidomyia).
—— vocatoria Fall.
Heleodromia immaculata Hal.
(Sciodromia).
Drapetis ambigua Macq. Collin.
(—— flexuosa Lw.).
—— assimilis Fall.
—— curvipes Mg.
(—— setigera Lw. ap. Lundb.).
(—— moriella Zett.).
—— exilis Mg.
(—— pusilla Lw.).
—— flavipes Macq.
—— incompleta Collin.
—— (exilis Mg. ap. Lundb.).
—— nigritella Zett.
(—— aterrima Curt. ap. Lundb.).
Stilpon graminum Fall.
—— lunata Walk.
Tachypeza fuscipennis Fall.
—— nubila Mg.
Tachista annulimana Mg.
—— arrogans L.
—— connexa Mg.
—— costalis Lw.
(——tuberculata Lw.).
—— sabulosa Winth.
—— terricola Zett.
Elaphropeza ephippiata Fall.
Coloboneura hirta Walk.
(Chersodromia).
Chersodromia arenaria Fall.
—— brevicornis de Meij.
—— cursitans Zett.
— incana Walk.
Symballophthalmus dissimilis Fall.
Coryneta agilis Mg.
(Tachydromia).
—— albiseta Panz.
—— albocapillata Fall.
—— annulata Fall.
—— annulipes Mg.
—— bicolor Mg.
—— calceata Mg.
—— candicans Fall.
(—— major Bonsd.).
—— ciliaris Fall.
(Tachydromia) cothurnata Marcq.
—— cursitans F.
(—— fasciata ap. Lundb.).
—— exilis Mg.
—— fasciata Mg.
(—— cursitans ap. Lundb.).
—— fascipes Mg.
(—— notata Mg.).
—— flavicornis Mg.
(—— albicornis Zett.).
(—— pallidicornis Collin).
—— flavipes F.
—— fuscicornis Zett.
—— leucocephala v. Ros.
(—— luteola Collin).
—— longicornis Mg.
—— lutea Mg.
—— maculipes Mg.
—— major Zett.
—— minuta Mg.
(—— exigua Mg.).
—— nigrina Mg.
—— nigritarsis Zett.
—— pallidiventris Mg.
—— pallipes Fall.
—— pectoralis Fall.
—— rapida Mg.
—— unguiculata Zett.
Platycnema pulicaria Fall.

29. Dolichopodidae.

Dolichopus acuticornis Wied.
—— aemulus Lw.
—— agilis Mg.
—— arbustorum Stann.
—— atratus Mg.
—— atripes Mg.
—— brevipennis Mg.
—— campestris Mg.
—— cilifemoratus Macq.
(—— trivialis Hal.).
—— claviger Stann.
—— clavipes Hal.
—— excisus Lw.
—— festivus Hal.
—— griseipennis Stann.
—— lepidus Staeg.
—— linearis Mg.
—— longicornis Stann.
—— longitarsis Stann.
—— migrans Zet.
(—— confusus Zett.).
—— nigricornis Mg.
(—— discifer Stann.).
—— nitidus Fall.
—— notatus Staeg.
(—— notabilis Zett.).
—— nubilus Mg.
—— pennatus Mg.
—— picipes Mg.
—— planitarsis Fall.

Dolichopus plumipes Scop.
—— plumitarsis Fall.
—— popularis Wied.
—— sabinus Hal.
—— signatus Mg.
—— tanythrix Lw.
—— ungulatus L.
—— urbanus Stann.
—— vitripennis Mg.
—— wahlbergi Zett.
—— (Macrodolichopus) diadema [Hal.
—— (Hygroceleuthus).
—— —— latipennis Fall.
Hercostomus aerosus Fall.
—— assimilis Hal.
—— bicolor Macq.
(—— nigricornis auct.).
—— brevicornis Staeg.
—— celer Mg.
—— chalybeus Wied.
—— chrysozygos Wied.
—— cupreus Fall.
—— germanus Wied.
—— metallicus Stann.
—— nanus Macq.
—— nigrilamellatus Macq.
—— nigripennis Fall.
—— nigriplantis Stann.
—— plagiatus Lw.
Poecilobothrus infuscatus Stann.
(—— ducalis Lw.).
—— nobilitatus L.
—— principalis Lw.
Hypophyllus crinipes Staeg.
—— discipes Ahr.
—— obscurellus Fall.
Tachytrechus insignis Stann.
—— plumipes Fall.
(—— ammobates Walk.).
Hydrophorus balticus Mg.
—— bipunctatus Lehm.
—— bisetus Lw.
—— litoreus Fall.
—— nebulosus Fall.
—— praecox Lehm.
Liancalus virens Scop.
Schoenophilus versutus Walk.
Thinophilus flavipalpis Zett.
—— ruficornis Hal.
Aphrosylus ferox Walk.
Medetera ambigua Zett.
—— dendrobaena Kow.
—— diadema Lw.
—— jacula Fall.
—— (Oligochaetus) micacea Lw.
—— muralis Mg.
—— obscura Zett.
—— pallipes Zett.
—— pinicola Kow.
—— (Oligochaetus) plumbella Mg.
Medetera tristis Zett.
—— truncorum Mg.
Rhaphium longicorne Fall.
Porphyrops communis Mg.
—— (spinicoxa Lw.).
— discolor Zett.
(—— consobrina Zett.).
—— elegantula Mg.
—— fascipes Mg.
—— laticornis Fall.
(—— nemorum Mg.).
—— micans Mg.
—— nasuta Fall.
—— penicillata Lw.
—— praerosa Lw.
Xiphandrium appendiculatum Zett.
—— caliginosum Mg.
—— fasciatum Mg.
—— monotrichum Lw.
—— quadrifilatum Lw.
Systenus pallipes v. Ros.
(—— adpropinquans Lw.).
—— leucurus Lw.
Syntormon denticulatus Zett.
(—— punctatus Zett.).
—— pallipes F.
—— pumilus Mg.
—— tarsatus Fall.
Machaerium maritimae Hal.
Achalcus cinereus Walk.
—— flavicollis Mg.
Neurigona erichsoni Zett.
—— quadrifasciata F.
—— suturalis Fall.
Thrypticus bellus Lw.
—— smaragdinus Gerst.
Diaphorus hoffmannseggi Mg.
(—— tripilus Lw.).
—— nigricans Mg.
—— oculatus Fall.
—— winthemi Mg.
Melanostolus melancholicus Lw.
Nematoproctus distendens Mg.
Chrysotus cilipes Mg.
—— cupreus Macq.
—— femoratus Zett.
—— gramineus Fall.
—— kowarzi Lundb.
(—— amplicornis Zett. ap. Kow.).
—— laesus Wied.
—— neglectus Wied.
—— pulchellus Kow.
—— suavis Lw.
Argyra argentina Mg.
—— argyria Mg.
—— atriceps Lw.
—— diaphana F.
—— elongata Zett.
—— grata Lw.
—— leucocephala Mg.
Leucostola vestita Wied.

Campsicnemus (Ectomus) alpinus [Hal.
(—— —— pictipennis Boh.).
—— armatus Zett.
(—— pectinifer de Meij.).
—— compeditus Lw.
—— curvipes Fall.
—— loripes Hal.
—— scambus Fall.
Sympycnus annulipes Mg.
Acropsilus niger Lw.
Tenchophorus calcaratus Macq.
—— monacanthus Lw.
—— spinigerellus Zett.
Telmaturgus tumidulus Radl.
Micromorphus albipes Zett.
Anepsiomyia flaviventris Mg.
Chrysotimus molliculus Fall.
Lamprochromus elegans Mg.
(Sympycnus).
Bathycranium bicolorellum Zett.
Xanthochlorus ornatus Hal.
—— tenellus Wied.
Sciopus albifrons Mg.
(Psilopus).
—— contristans Wied.
—— exul Par.
—— laetus Mg.
—— lobipes Mg.
—— longulus Fall.
(—— lugens Mg.).
—— nervosus Lehm.
—— pallens Wied.
—— platypterus F.
—— vialis Radd.
—— wiedemanni Fall.

30. Musidoridae.

(Lonchopteridae).
Musidora fallax de Meij.
(Lonchoptera).
—— furcata Fall.
—— lutea Panz.
—— meyerei Collin.
—— tristis Mg.

31. Syrphidae.

Pipiza bimaculata Mg.
—— carbonaria Mg.
—— festiva Mg.
—— lugubris F.
—— noctiluca L.
—— quadrimaculata Panz.
—— signata Mg.
Heringia flavitarsis Mg.
—— heringi Zett.
—— maculipennis Mg.
—— virens F.
Triglyphus primus Lw.
Cnemodon vitripennis Mg.
Orthoneura elegans Mg.
Liogaster metallina F.
—— splendida Mg.
Chrysogaster chalybeata Macq.
—— hirtella Lw.
—— macquarti Lw.
—— solstitialis Fall.
—— splendens Mg.
(—— virescens Lw.).
—— viduata L.
Chilosia albipila Mg.
—— albitarsis Mg.
—— bergenstammi Beck.
—— canicularis Panz.
—— chrysocoma Mg.
—— cynocephala Lw.
—— fasciata Schin. Egg.
—— fraterna Mg.
—— grossa Fall.
—— illustrata Harr.
—— impressa Lw.
—— intonsa Lw.
—— longula Zett.
—— mutabilis Fall.
—— nigripes Mg.
—— pagana Mg.
—— proxima Zett.
—— pubera Zett.
—— ruralis Mg.
—— scutellata Fall.
—— semifasciata Beck.
—— variabilis Panz.
—— vernalis Fall.
Pelecocera tricincta Mg.
Chamaesyrphus scaevoides Fall.
Sphegina clunipes Fall.
Neoascia dispar Mg.
—— floralis Mg.
—— podagrica F.
Rhingia campestris Mg.
—— rostrata L.
Brachyopa bicolor Fall.
Paragus bicolor F.
—— —— var. lacerus Lw.
—— tibialis Fall.
Pyrophaena granditarsa Forst.
—— rosarum F.
Platychirus albimanus F.
—— angustatus Zett.
—— clypatus Mg.
—— fulviventris Macq.
—— immarginatus Zett.
—— manicatus Mg.
—— peltatus Mg.
—— scambus Staeg.
—— scutatus Mg.
Melanostoma ambiguum Fall.
—— mellinum L.
—— scalare F.
Xanthandrus comtus Harr.
(Melanostoma hyalinatum Fall.).

Melangyna quadrimaculata Verr.
Ischyrosyrphus glaucius L.
—— laternarius Müll.
Epistrophe auricollis Mg.
(Syrphus).
—— balteata de G.
—— bifasciata F.
—— cinctella Zett.
—— cincta Fall.
—— grossulariae Mg.
—— guttata Fall.
—— lasiophthalma Zett.
—— lineola Zett.
—— macularis Zett.
—— triangulifera Zett.
—— umbellatarum F.
—— vittigera Zett.
Eriozona syrphoides Fall.
Leucozona lucorum L.
Lasiopticus pyrastri L.
—— —— var. unicolor Curt.
—— seleniticus Mg.
Didea fasciata Macq.
—— intermedia Lw.
Syrphus albostriatus Fall.
—— —— var. confusus Egg.
—— arcuatus Fall.
—— corollae F.
—— latifasciatus Macq.
—— luniger Mg.
—— lunulatus Mg.
—— nitens Zett.
—— nitidicollis Mg.
—— ribesii L.
—— torvus O. S.
—— tricinctus Fall.
—— venustus Mg.
—— vitripennis Mg.
Sphaerophoria menthastri L.
(Melithreptus) —— var. philanthus.
—— —— var. picta Mg.
—— rüppelli Wied var. nitidicollis [Zett.
(—— flavicauda Zett. var. [nitidicollis Zett.).
—— scripta L.
—— —— var. dispar Lw.
—— —— var. strigata Zett.
Xanthogramma citrofasciatum de G.
—— ornatum Mg.
Doros conopeus F.
Baccha elongata F.
—— obscuripennis Mg.
Chrysotoxum bicinctum L.
—— cautum Harr.
—— festivum L.
—— octomaculatum Curt.
—— vernale Lw.
Psarus abdominalis F.
Microdon devius L.
—— eggeri Mik.
Microdon mutabilis L.
Volucella bombylans L.
—— inanis L.
—— inflata F.
—— pellucens L.
—— zonaria Poda.
Eristalinus sepulcralis L.
Lathyrophthalmus aeneus Scop.
Eristalomyia anthophorina Fall.
—— cryptarum F.
—— tenax L.
Eristalis alpina Panz.
—— arbustorum L.
—— horticola de G.
—— intricaria L.
—— lucorum Mg. Vill. Lichtw.
—— nemorum L.
—— pertinax Scop.
—— pratorum Mg.
Myiatropa florea L.
Liops vittata Mg.
Tubifera pendula L.
(Helophilus).
—— trivittata F.
Parhelophilus frutetorum F.
—— lunulatus Mg.
—— versicolor F.
Eurinomyia lineata F.
—— transfuga L.
Lampetia equestris F.
(Merodon).
—— spinipes F.
Mallota fuciformis F.
Cerioides conopoides L.
—— subsessilis Ill.
(Ceria).
Arctophila bombiformis Fall.
—— mussitans F.
Cinxia borealis Fall.
(Sericomyia).
—— lappona L.
Brachypalpus bimaculatus Macq.
—— meigeni Schin.
—— valgus Panz.
Penthesilea asilica Fall.
(Criorrhina).
—— berberina F.
—— —— var. oxyacanthae Mg.
—— ranunculi Panz.
Tropidia scita Harr.
(—— milesiformis Fall.).
Syritta pipiens L.
Zelima femorata L.
(Xylota).
—— florum F.
—— lenta Mg.
—— nemorum F.
—— pigra F.
—— segnis L.
—— sylvarum L.
Eumerus ornatus Mg.

Eumerus sabulonum Fall.
—— strigatus Fall.
Ferdinandea cuprea Scop.
(Chrysochlamis).
—— ruficornis F.
Spilomyia saltuum F.
Temnostoma vespiforme L.

32. Dorylaidae.

(Pipunculidae).
Chalarus basalis Lw.
—— spurius Fall.
Verrallia aucta Fall.
—— villosa v. Ros.
Dorylas campestris Latr.
(Pipunculus ater Mg.).
—— flavipes Mg.
—— furcatus Egg.
—— fuscipes Zett.
—— geniculatus Mg.
(—— nigritulus Zett.).
—— haemorrhoidalis Zett.
—— minimus Beck.
(—— littoralis Beck.).
—— perspicuus de Meij.
—— pratorum Fall.
(—— thomsoni Beck.).
—— rufipes Mg.
—— semifumosus Kow.
—— sylvaticus Mg.
—— terminalis Thoms.
—— xanthocerus Kow.
—— zonatus Zett.

33. Phoridae.

Aneurina curvinervis Beck.
(Chaetoneurophora).
—— thoracica Mg.
—— unispinosa Zett.
(—— fennica Beck.).
—— urbana Mg.
(—— caliginosa Mg. de Meij.).
Chaetopleurophora bohemani Beck.
—— erythronota Strobl.
—— —— var. nigrodorsata Strobl.
—— spinosa Schm.
Triphleba aprilina Schm.
(Trupheoneura) autumnalis Beck.
—— dudai Schm.
(—— pauciseta Schm. ♀).
—— excisa Lundb.
—— hentrichi Schm.
—— hyalinata Mg.
(—— perennis Mg.).
—— intermedia Mall.
—— lugubris Mg.
(—— sublugubris Wood ap. de Meij.).
—— luteifemorata Wood.
(—— ♂ similis Lundb.).
—— octobris Schm.
(Trupheoneura) opaca Mg.
—— papillata Wing.
(—— lugubris Mg. in Suppl.).
—— perenniformis Schm.
—— radiosetosa Schm.
—— trinervis Beck.
—— tumidula Schm.
—— uncinata Schm.
(Pseudostenophora) crassinervis Strobl.
—— nudipalpis Beck.
—— unicalcarata Beck.
(—— unispinosa Zett. ap. de Meij. [in Suppl.).
Spinophora bergenstammi Mik.
(—— domestica Wood.).
—— dorsalis Beck.
(—— immaculata Strobl.).
—— excisa Beck.
(—— bergenstammi auct.).
—— helicivora Duf.
(—— maculata Mg. ap. de Meij. [in Suppl.).
Beckerina umbrimargo Beck.
Diploneura abdominalis Fall.
—— concinna Mg.
(—— crassicornis Mg. ap. de Meij. [suppl. 3).
—— florea F.
—— funebris Mg. var. rostralis Schm.
—— glabra Schm.
—— nitidula Mg.
—— pachycera Schm.
—— pilosella Schm.
—— (Tristoechia) abbreviata v. Ros.
—— (Dohrniphora) cornuta Big.
(—— —— chlorogastra Beck.).
Phora aterrima F.
—— edentula Schm.
—— holosericea Mg.
—— schineri Beck.
—— tincta Schm.
—— velutina Mg.
Hypocera subsultans L.
(—— mordellaria Fall. de Meij. [in Suppl.).
Borophora (Borophora s.str.) [femorata Mg.
(—— —— flavimana Mg. de Meij. [suppl. 3).
—— ókellyi Schm.
—— (Peromitra) agilis Mg.
—— —— carinifrons Zett.
—— —— erythrocera Mg.
(—— —— bernuthi Egg. de Meij. [in Suppl.).
—— —— germanica Schm.
—— —— incrassata Mg.
Conicera atra Mg.
(—— dauci Mg.).
—— pauxilla Schm.
—— floricola Schm.

Conicera similis Hal. ap. Schmitz.).
—— —— var. fulvipalpis Schm.
—— schnittmanni Schm.
—— tarsalis Schm.
—— tibialis Schm.
(—— albipennis Olg.).
Gymnoptera longicostalis Schm.
(—— vitripennis Mg. Schm.).
—— vitripennis Mg.
(—— genitalis Schm.).
Plectanocnema nudipes Beck.
Aenigmatias dorni End.
Woodiphora retroversa Wood.
Gymnophora arcuata Mg.
—— nigripennis Schm.
(—— fuliginosa Mg. ap. de Meij. [in Suppl.).
—— quartomollis Schm.
Pseudacteon formicarum Verr.
—— lundbecki Schm.
Megaselia (subg. Aphiochaeta) [aculeata Schm.
—— —— affinis Wood.
(—— —— proxima Lundb.).
(—— —— ornatipes Schm.).
—— —— aequalis Wood.
—— —— albiclava Schm.
—— —— alticolella Wood, Lundb.
—— —— altifrons Wood.
—— —— angustipennis Lundb.
—— —— aristica Schm.
—— —— armipes Schm.
—— —— atrimana Wood.
(—— —— egregia Lundb.).
(—— —— hastata Schm.).
(—— —— hirsuta Wood.).
—— —— basispinata Lundb.
—— —— beckeri Wood.
—— —— brevicornis Schm.
—— —— campestris Wood.
—— —— ciliata Zett.
—— —— coaequalis Schm.
—— —— communiformis Schm.
—— —— conformis Wood.
(—— —— carpalis Schm.).
—— —— consetigera Schm.
—— —— consimilis Lundb.
—— —— cothurnata Schm.
—— —— crassipes Wood.
(—— —— dactylata Lundb.).
—— —— cuspidata Schm.
—— —— dahli Beck.
—— —— diversa Wood.
(—— —— sordescens Schm.).
—— —— dubitalis Wood.
—— —— fenestralis Schm.
—— —— flavescens Wood.
—— —— flavicoxa Zett.
—— —— frameata Schm.
—— —— fumata Mall.
—— —— fungivora Wood.
Megaselia (subg. Aphiochaeta) [fuscovariana Schm.
—— —— hibernans Schm.
—— —— hirticrus Schm.
—— —— hortensis Wood.
—— —— hyalipennis Wood.
—— —— hypopygialis Lundb.
—— —— ignobilis Schm.
—— —— indifferens Lundb.
(—— —— perciliata Lundb.).
—— —— insons Lundb.
—— —— intercostata Lundb.
—— —— involuta Wood.
—— —— latifrons Wood.
—— —— limburgensis Schm.
—— —— lucifrons Schm.
—— —— luteipes Schm.
—— —— major Wood.
—— —— manicata Wood.
(—— —— hirsuta Wood, [Schmitz vroeger).
—— —— manualis Schm.
—— —— meconicera Speis.
(—— —— albipennis Wood.).
—— —— mirifica Schm.
—— —— obscuripennis Wood.
—— —— paludosa Wood.
—— —— pectoralis Wood.
—— —— pedatella Schm.
—— —— pilifemur Lundb.
—— —— pleuralis Wood.
—— —— posticata Strobl.
—— —— projecta Beck.
—— —— var. funesta Schm.
—— —— protarsalis Schm.
—— —— pumila Mg.
(—— —— atripes Brues).
—— —— pungens Lundb.
—— —— pusilla Mg.
(—— —— clavipes Wood).
—— —— rufa Wood.
—— —— sepulcralis Lundb.
—— —— setulipalpis Schm.
—— —— simplex Wood.
—— —— simulans Wood.
—— —— stichata Lundb.
—— —— styloprocta Schm.
—— —— subcarpalis Lundb.
—— —— subconvexa Lundb.
—— —— subfraudulenta Schm.
—— —— subpleuralis Wood.
—— —— superciliata Wood.
—— —— tama Schm.
—— —— triquetra Schm.
—— —— unguicularis Wood.
—— —— unicolor Schm.
—— —— variana Schm.
(—— —— variabilis Wood).
—— —— vestita Wood.
—— —— waagei Schm.
—— (subg. Megaselia) albicans [Wood.

Megaselia (subg. Megaselia) albicaudata Wood.
—— —— albidohalteris Felt.
(—— —— exigua Wood in suppl.).
—— —— analis Lundb.
—— —— angelicae Wood.
—— —— angusta Wood.
—— —— angustifrons Wood.
—— —— berndseni Schm.
—— —— bovista Ginn.
(—— —— exigua Wood).
—— —— brevicostalis Wood.
—— —— breviseta Wood.
—— —— breviterga Lundb.
—— —— cinereifrons Strobl.
(—— —— anisodactyla Schm.).
—— —— coacta Lundb.
—— —— collini Wood.
—— —— correlata Schm.
—— —— costalis v. Ros.
—— —— deflexa Schm. i. litt.
—— —— crassicosta Strobl.
—— —— densior Schm.
—— —— discreta Wood.
—— —— emarginata Wood.
—— —— errata Wood.
—— —— feronia Schm.
—— —— flava Fall.
—— —— furcatinervis Schm.
—— —— fusca Wood.
—— —— fuscinervis Wood.
—— —— giraudii Egg.
(—— —— rata Wood.).
—— —— glabrifrons Wood.
—— —— gregaria Wood.
—— —— halterata Wood.
—— —— hilaris Schm.
—— —— hirticaudata Wood.
—— —— hirtiventris Wood.
—— —— humeralis Zett.
—— —— impolluta Schm.
—— —— infraposita Schm.
—— —— irregularifrons Schm.
—— —— largifrontalis Schm.
—— —— lata Wood.
—— —— latifemorata Beck.
—— —— latipalpis Schm.
—— —— longicostalis Wood.
—— —— longipalpis Wood.
—— —— longiseta Wood.
—— —— lutea Meig.
(—— —— sulphuripes Mg. ap. Lundb.).
—— —— lutescens Wood.
—— —— maura Wood.
—— —— meigeni Beck.
—— —— melanocephala v. Ros.
—— —— minor Zett.
—— —— mixta Schm.
—— —— nigrescens Wood.
—— —— nudiventris Wood.
(Megaselia (subg. Megaselia) aperta Schm. in suppl. 4).
—— —— offuscata Schm.
—— —— parva Wood.
—— —— phoenicura Schm.
—— —— picta Schm.
—— —— plurispinosa Lundb.
—— —— plurispinulosa Zett.
(—— —— giraudii Egg. (in suppl.).
—— —— praeacuta Schm.
—— —— propinqua Wood.
—— —— pseudogiraudii Schm.
—— —— pulicaria Fall.
—— —— pygmaea Zett.
—— —— pygmaeoides Lundb.
—— —— quadriseta Schm.
(—— —— lutea Mg. var. quadriseta Schm.).
—— —— rata Wood.
(—— —— giraudii Egg.).
—— —— rubella Schm.
—— —— ruficornis Mg.
—— —— rufifrons Wood.
—— —— rufipes Mg.
—— —— sanguinea Schm.
—— —— scutellariformis Schm.
—— —— scutellaris Wood.
—— —— sinuata Schm.
—— —— spinicincta Wood.
—— —— stigmatica Schm.
—— —— subnudipennis Schm.
—— —— subtumida Wood.
—— —— sulphuripes Mg.
(—— —— fuscohalterata Schm.)
—— —— tarsalis Wood.
—— —— tumida Wood.
—— —— uliginosa Wood.
—— —— ustulata Schm.
(—— —— pallida Lundb.).
—— —— verna Schm.
—— —— vernalis Wood.
—— —— virilis Schm.
—— —— zonata Zett.
Phalacrotophora berolinensis Schm.
—— fasciata Fall.
Metopina crassinervis Schm.
—— cuneata Schm.
—— heselhausi Schm.
—— perpusilla Six.
(—— galeata Hal. ap. Schm.)

34. Clythiidae.

(Platypezidae).
Opetia nigra Mg.
Calomyia amoena Mg.
—— elegans Mg.
—— speciosa Mg.
Agathomyia antennata Zett.
—— sexmaculata v. Ros.
Clythia atra Mg.

(Platypeza)
—— consobrina Zett.
—— dorsalis Mg.
—— fasciata Mg.
—— furcata Fall.
—— infumata Hal.
—— modesta Zett.
—— picta Mg.
—— rufa Mg.

35. Conopidae.

Physocephala chrysorrhoea Mg.
—— nigra de G.
—— rufipes F.
—— vittata F.
Conops flavipes F.
—— quadrifasciatus de G.
—— strigatus Wied.
—— vesicularis L.
Zodion cinereum F.
—— notatum Mg.
Myopa buccata L.
—— dorsalis F.
—— fasciata Mg.
—— polystigma Rond.
—— testacea L.
Occemyia atra F.
—— pusilla Mg.
Sicus ferrugineus L.
Dalmannia punctata F.

37. Sciomyzidae.

Phaeomyia fuscipennis Mg.
Sciomyza albocostata Fall.
—— dorsata Zett.
—— dubia Fall.
—— griseola Fall.
—— nana Fall.
—— obtusa Fall.
—— pallidiventris Fall.
—— ventralis Fall.
Ditaenia cinerella Fall.
Ditaeniella grisescens Mg.
Pherbellia schönherri Fall.
Bischofia simplex Fall.
—— testacea Macq.
Calobaea bifasciella Fall.
Dichrochira glabricola Fall.
—— leucopeza Mg.
—— nigrimana Mg.
Ctenulus distinctus Mg.
—— pectoralis Zett.
Renocera strobli Hend.
—— pallida Fall.
—— striata Mg.
Antichaeta analis Mg.
Tetanocera elata F.
—— ferruginea Fall.
—— hyalipennis v. Ros.
(—— laevifrons Lw.)
Tetanocera robusta Lw.
—— silvatica Mg.
—— unicolor Lw.
Dictya umbrarum L.
Trypetoptera punctulata Scop.
Pherbina coryleti Scop.
—— punctata F.
Hedroneura cucularia L.
—— rufa Panz.
Elgiva albiseta Scop.
—— lineata Fall.
Hydromyia dorsalis F.
Limnia fenestrata Macq.
—— fumigata Scop.
(—— rufifrons F.)
—— unguicornis Scop.
Coremacera marginata F.
Sepedon sphegeus F.
—— spinipes Scop.
Dichetophora obliterata F.

38. Dryomyzidae.

Dryomyza flaveola F.
Neuroctena anilis Fall.
Helcomyza ustulata Curt.
(Actora aestuum Mg.)
Heterochila buccata Fall.
(Oedoparea).

39a. Sepsidae.

Sepsis cynipsea L., Collin.
(—— incisa Strobl.)
—— flavimana Mg.
—— fulgens Hff. Mg.
(—— tonsa Duda)
—— meyerei Duda.
—— nigripes Mg.
—— orthocnemis Frey.
—— punctum F.
—— —— var. violacea Mg.
—— thoracica R. D.
(—— pectoralis Macq.).
Sepsidomorpha pilipes v. d. W.
Pandora scutellaris Fall.
Enicita annulipes Mg.
—— —— var. crassiseta Duda.
Themira lucida Stgr.
(♂ = —— dentimana v. d. W. ♂)
(♀ = —— consobrina v. d. W. ♂).
—— putris L.
—— superba Hal.
(—— ciliata Staeg.)
Cheligaster leachi Mg.
(♂ = Themira curvipes v. d. W. ♂)
(♀ = Nemopoda umbripennis [v. d. W.).
Enicomira minor Hal.
(♀ = Themira consobrina [v. d. W. ♀).
Meroplius stercorarius R. D.
Nemopoda cylindrica F.

39b. Megamerinidae.

Megamerina loxocerina F.
(Lissa).

40. Piophilidae.

Piophila (s.str.) casei L.
—— (Liopiophila) nigriceps Mg.
—— —— nigricornis Mg.
—— —— nigrimana Mg.
—— —— varipes Mg.
—— (Allopiophila) luteata Hal.
—— —— vulgaris Fall.
Mycetaulus bipunctatus Fall.
(Geomyza bimaculata Mg.).

41. Psilidae.

Psila fimetaria L.
Chamaepsila atra Mg.
—— atrimana Mg.
—— bicolor Mg.
—— debilis Egg.
—— gracilis Mg.
—— limbatella Zett.
—— nigra Fall.
—— nigricornis Mg.
—— pectoralis Mg.
—— rosae F.
—— rufa Mg.
Platystyla hoffmannseggi Mg.
Chyliza permixta Rond.
(—— leptogaster Panz.).
—— vittata Mg.
Megachetum atriseta Mg.
Loxocera albiseta Schrk.
(—— ichneumonea L. in N. N.).
—— fulviventris Mg.
—— ichneumonea L.
(—— elongata Mg.).
—— sylvatica Mg.

42. Tylidae.

(Micropezidae).
(Calobatidae).
Trepidaria.
(Calobata).
—— (Cnodacophora) adusta Lw.
—— (Paracalobata) ephippium F.
—— (Compsobata) cibaria Mg.
(—— —— trivialis Lw.).
—— —— commutata Czerny.
(—— —— cothurnata Panz.).
—— —— femoralis Mg.
—— (Trepidaria) petronella L.
Tylus corrigiolatus L.
(Micropeza).
—— lateralis Mg.

43. Lonchaeidae.

Lonchaea chorea F.
(—— vaginalis Fall.).
Lonchaea hirticeps Zett.
—— laticornis Mg.
—— lucidiventris Beck.
—— palposa Zett.
—— tarsata Fall.
—— zetterstedti Beck.
Spermatolonchaea flavidipennis Zett.
(—— fumosa Egg.).
—— nigra Mg.
—— viridana Mg.
Chaetolonchaea dasyops Mg.
Palloptera campta Czerny.
(—— arcuata F. Mg.).
(—— inusta Mg.).
—— saltuum L.
—— umbellatarum F.
—— usta Mg.
—— ustulata Fall.

44. Tanypezidae.

Tanypeza longimana Fall.

45. Ulidiidae.

Seoptera vibrans L.
(Myodina).
Chrysomyza demandata F.

46. Pterocallidae.

Myennis fasciata F.

47. Ortalidae.

Tetanops myopina Fall.
Ptilonota guttata Mg.
Herina frondescentiae L.
—— nigrina Mg.
—— palustris Mg.
Meliera cana Lw.
(Ceroxys).
—— crassipennis Fall.
—— omissa Mg.
—— picta Mg.
Ortalis urticae L.
Myrmecophyia rufipes Mg.

48. Platystomidae.

Platystoma seminationis L.
Rivellia syngenesiae F.

49. Trypetidae.

Euribia aprica Fall.
—— cardui L.
—— cuspidata Mg.
—— jaceana Her.
(—— cuspidata in suppl. V).
—— quadrifasciata Mg.
—— solstitialis L.
—— stylata F.
Platyparea pooeciloptera Schrk.
Platyparella discoidea F.

Euphranta connexa F.
Rhagoletis alternata Fall.
—— cerasi L.
—— meigeni Lw.
Trypeta artemisiae F.
—— hamifera Lw.
—— zoë Mg.
Gonioglossum wiedemanni Mg.
(Orellia).
Phagocarpus permundus Harr.
(Anomoea antica Wied.).
Acidia cognata Wied.
Philophylla heraclei L.
Myiolia caesio Harr.
Cryptaciura rotundiventris Fall.
Ceriocera ceratocera Hend.
(Trypeta cornuta F.).
Chaetorellia jaceae R. D.
Chaetostomella onotrophes Lw.
Terellia serratulae L.
Orellia colon Mg.
—— falcata Scop.
—— ruficauda F.
—— tussilaginis F.
—— winthemi Mg.
Acinia corniculata Zett.
Xyphosia miliaria Schrk.
Paroxyna absinthii F.
(Tephritis elongatula Lw.).
—— argyrocephala Lw.
—— plantaginis Hal.
—— tessellata Lw.
Oxyna flavipennis Lw.
—— nebulosa Wied.
(Tephritis proboscidea Lw.).
—— parietina L.
Sphenella marginata F.
Ensina sonchi L.
Tephritis angustipennis Lw.
—— arnicae L.
—— leontodontis de G.
—— nesii Wied.
(Urellia conjuncta Lw.).
—— ruralis Lw.
—— vespertina Lw.
Trypanea stellata Fuessly.
Noeeta pupillata Fall.
Ditricha guttularis Mg.

50. Lauxaniidae.

Trigonometopus frontalis Mg.
Homoneura interstincta Fall.
(Scyphella).
—— notata Fall.
—— vicina de Meij.
Minettia desmometopa de Meij.
—— fasciata Fall.
—— longipennis F.
—— longiseta Lw.
—— lupulina F.
—— plumicornis Fall.
(Minettia abbreviata Beck.).
Prraphochaeta inusta Mg.
(—— spectabilis Lw.).
—— uncinata de Meij.
Tricholauxania praeusta Fall.
Meiosimyza platycephala Lw.
(—— difformis Lw.).
Aulogastromyia anisodactyla Lw.
Peplomyza litura Mg.
Lycia affinis Zett.
—— decempunctata Fall.
—— decipiens Lw.
—— illota Lw.
—— pallidiventris Fall.
—— rorida Fall.
—— subfasciata Zett.
Sapromyza apicalis Lw.
—— atripes Mg.
—— bipunctata Mg.
—— hyalinata Mg.
(—— frontalis Lw.).
—— obsoleta Fall.
—— quadripunctata Fall.
—— setiventris Zett.
—— sexpunctata Mg.
—— simplex Lw.
Paralauxania albiceps Fall.
Halidayella aenea Fall.
(Lauxania).
—— nitens Lw.
Lauxania cylindricornis F.

51. Chamaemyidae.

Leucopis (Leucopomyia) [silesiaca Egg.
(—— —— annulipes Oldenb.).
Leucopis (s.str.) griseola Fall.
—— —— impunctata v. Ros.
—— —— (argentata Heeg.).
—— —— nigricornis Egg.
—— —— olivacea de Meij.
—— (Lipoleucopis) praecox de Meij.
Chamaemyia elegans Panz.
(Ochthiphila).
—— flavipalpis Hal.
(—— maritima Zett.).
—— geniculata Zett.
—— juncorum Fall.
(—— aridella Fall.).
—— polystigma Mg.
Parochthiphila coronata Lw.
(Ochthiphila cornuta Lw. laps. cal.) in N. N.
—— spectabilis Lw.

52. Coelopidae.

Malacomyza sciomyzina Hal.
(Phycodromia).
Coelopa pilipes Hal.
Orygma luctuosum Mg.

53. Helomyzidae.

Suillia affinis Mg.
(Helomyza).
—— bicolor Zett.
(—— zetterstedti Lw.).
—— flava Mg.
—— fuscicornis Zett.
(—— montana Lw.).
—— humilis Mg.
—— inornata Lw.
—— nemorum Mg.
—— notata Mg.
(—— pectoralis Lw.).
—— pallida Fall.
(—— olens Mg.).
(—— testacea Zett.).
—— similis Mg.
(—— tigrina Cz.).
—— variegata Lw.
Allophyla atricornis Mg.
Heteromyza oculata Fall.
Thelida atricornis Mg.
Tephrochlamys flavipes Zett.
—— laeta Mg.
—— rufiventris Mg.
—— tarsalis Zett.
Neoleria inscripta Mg.
—— ruficeps Zett.
(—— crepusculascens Schm.)
Oecothea fenestralis Fall.
—— praecox Lw.
Eccoptomera emarginata Lw.
—— filata Lw.
—— longiseta Mg.
—— microps Mg.
—— obscura Mg.
(—— excisa Lw.).
—— pallescens Mg.
Spanoparea ruficornis Mg.
Amoebaleria amplicornis Czerny.
(—— spectabilis Lw.).
—— caesia Mg.
Scoliocentra villosa Mg.
—— villosula Czerny.
Helomyza breviciliata Schm.
(Leria).
—— dupliciseta Strobl.
—— modesta Mg.
—— serrata L.
Trichoscelis frontalis Fall.
(Geomyza).
—— marginella Fall.
—— obscurella Fall.
—— pedestris Lw.
Chiromyia flava L.
(Scyphella).
—— flavella Zett.
(—— —— minima Beck.).
—— oppidana Scop.
(—— lutea Fall.).

54a. Clusiidae.

(Heteroneuridae).
Clusiodes.
(Heteroneura).
—— (Clusiodes) albimana Mg.
—— —— caledonica Coll.
Clusia flava Mg.

54b. Anthomyzidae.

Anthomyza albimana Mg.
(Melanochira).
—— cingulata Hal.
—— fasciata Wood.
—— gracilis Fall.
—— pallida Zett.
—— sordidella Zett.
Paranthomyza nitida Mg.
Stiphrosoma sabulosum Hal.
Anagnota bicolor Mg.

54c. Opomyzidae.

Opomyza florum Fall.
—— germinationis L.
Geomyza apicalis Mg.
—— combinata L.
(—— venusta Mg.).
—— tripunctata Fall.

55. Tethinidae.

Tethina illota Hal.
(Madiza griseola v. d. W.).
Rhicnoessa grisea Fall.
(—— cinerea Lw.).
(—— latigenis Beck.).
Pelomyiella cinerella Hal.
—— mallochi Sturt.
(—— angustifacies de Meij.)
(—— kuntzei Czerny)

56d. Ephydridae.

Dichaeta brevicauda Lw.
—— caudata Fall.
Notiphila annulipes Stenh.
—— brunnipes R. D.
—— (chamaleon Beck.)
—— (stagnicola R. D.)
—— cinerea Fall.
—— dorsata Stenh.
—— maculata Stenh.
—— nigricornis Stenh.
—— riparia Mg.
—— uliginosa Hal.
—— venusta Lw.
Trimerina madizans Fall.
Hecamede albicans Mg.
Mosillus subsultans F.
Discomyza incurva Fall.
Atissa pygmaea Hal.
Ilythea spilota Curt.
Athyroglossa glabra Mg.

Psilopa leucostoma Mg.
—— nana Lw.
—— nigritella Stenh.
—— nitidula Fall.
Discocerina albifrons Mg.
(Clasiopa palliditarsis Beck.)
—— calceata Mg.
—— obscurella Fall.
—— plumosa Fall.
—— pulicaria Hal.
Hecamedoides glaucella Stenh.
Axysta cesta Hal.
Ochthera mantis de G.
Glenanthe ripicola Hal.
Hydrina flavipes Fall.
—— interrupta Hal.
—— punctatonervosa Fall.
—— sexmaculata Beck.
—— stictica Mg.
—— trilineata de Meij.
Philygriola picta Fall.
Hyadina guttata Fall.
—— humeralis Beck.
—— nitida Macq.
—— scutellata Hal.
Pelina aenea Fall.
—— aenescens Stenh.
Hydrellia albilabris Mg.
—— argyrogenis Beck.
—— chrysostoma Mg.
—— flaviceps Mg.
—— flavicornis Fall.
—— fusca Stenh.
—— griseola Fall.
—— incana Stenh.
(—— ranunculi auct.).
—— lapponica Stenh.
—— maura Mg.
—— modesta Lw.
—— mutata Zett.
—— nigripes Zett.
—— stratiotae Herr.
—— thoracica Hal.
Ephydra macellaria Egg.
—— micans Hal.
—— riparia Fall.
Caenia fumosa Stenh.
—— palustris Fall.
Scatella fallax Czerny
—— lutosa Hal.
—— paludum Mg.
—— quadrata Fall.
—— stagnalis Fall.
—— stenhammari Zett.
—— subguttata Mg.
—— (Lamproscatella) dichaeta Lw.
—— —— pilosigenis Beck.
—— —— sibilans Hal.
Philotelma defecta Hal.
—— nigripennis Mg.
Scatophila caviceps Stenh.
Scatophila despecta Hal.
—— laevigata Lw.
—— signata Lw.
—— variegata Lw.
Tichomyza fusca Macq.
Parhydra aquila Fall.
—— coarctata Fall.
—— fossarum Hal.
—— nigritarsis Strobl.
—— nubecula Beck.
—— pubera Lw.
—— pusilla Mg.
—— quadripunctata Mg.

56b. Canaceidae.

Dinomyia ranula Lw.
(Canace).

57. Sphaeroceridae.

(Cypselidae).
(Borboridae).
Sphaerocera curvipes Latr.
(—— subsultans F.)
—— micropyga Duda.
(—— denticulata Stenh.)
—— nitida Duda.
—— parapusilla Duda.
—— pusilla Fall.
(—— denticulata Mg.)
Borborus (Borborus) ater Mg.
(Cypsela).
(—— —— geniculatus Macq.)
—— Borborillus costalis Zett.
(—— —— opacifrons Duda).
—— Trichiaspis equinus Fall.
—— Stratioborborus fimetarius Mg.
(—— —— suillorum Hal.)
—— Crumomyia glabrifrons Mg.
(—— —— limbinervis Rond.)
—— Crumomyia glacialis Mg.
(—— —— notabilis Collin).
—— Crumomyia niger Mg.
(—— —— fimetarius Mg. Rond.).
—— Stratioborborus nitida Mg.
(—— —— nigriceps Rond.)
—— Borborillus nitidifrons Duda.
—— Apterina pedestris Mg.
—— Stratioborborus roseri Rond.
—— Trichiaspis similis Collin.
(—— —— pallipes Stenh.)
—— Borborillus sordidus Zett.
—— Trichiaspis stercorarius Mg.
(—— —— nigrofemoratus Macq.)
(—— —— tibialis Zett.)
—— Borborillus uncinatus Duda.
(—— —— hamatus Duda i. litt.).
(—— —— minutus laps. cal.)
—— Borborillus vitripennis Mg.
Limosina Coprophila acutangula Zett.
(—— —— pusilla Mg.)

(Leptocera).
—— Limosina appendiculata Vill.
(—— —— liliputana Rond. Duda).
—— Elachisoma aterrima Hal.
(—— —— nigerrima Hal.).
—— Trachyopella atoma Rond.
—— Limosina becquaerti Vill.
(—— —— herniata Duda).
—— Limosina bifrons Stenh.
(—— —— puerula Rond.)
—— Thoracochaeta brachystoma [Stenh.
—— Collinellula breviceps Stenh.
—— Paracollinella caenosa Rond.
—— Limosina claviventris Strobl.
(—— —— curtiventris Stenh.)
—— Opacifrons coxata Zett.
—— Limosina crassimana Hal.
—— Puncticorpus cribrata Vill.
(—— —— brevipenne Duda).
—— Paracollinella curvinervis Stenh.
(—— —— roralis Rond.)
—— Limosina exigua Rond.
—— Stenhammaria fenestralis Fall.
—— Coprophila ferruginata Stenh.
—— Limosina flavipes Mg.
(—— —— retracta Rond.)
—— Paracollinella fontinalis Fall.
—— Limosina fungicola Hal.
(—— —— vitripennis Zett.)
—— Collinellula fuscipennis Hal.
(—— —— oelandica Stenh.)
—— Limosina heteroneura Hal.
—— Coprophila hirtula Rond.
—— Spinitarsella humida Hal.
—— Collinellula limosa Fall. Stenh.
—— Limosina longisetosa Dahl.
—— Coprophila lugubris Hal.
—— Limosina luteilabris Rond.
—— Collinellula lutosa Stenh. Duda.
—— Trachyopella melania Hal.
(—— —— coprina Duda).
—— Limosina meyerei Duda.
—— Limosina mirabilis Collin.
—— Limosina moesta Vill.
(—— —— antennata Duda).
—— Limosina nana Rond.
—— Limosina ochripes Mg.
(—— —— fulviceps Rond.).
—— Limosina parapusio Dahl.
—— Limosina plumosula Rond.
—— Limosina pseudoleucoptera Duda.
—— Limosina pseudonivalis Dahl.
—— Limosina pullula Zett.
—— Limosina racovitzai Bezzi.
—— —— —— var. microps.
—— Limosina rufilabris Stenh.
—— Limosina schmitzi Duda.
—— Chaetopodella scutellaris Hal.
—— Limosina silvatica Mg.
—— Limosina simplicipes Duda.
(Leptocera) Limosina simplicimana [Duda).
—— Halidayina spinipennis Hal.
—— Coprophila vagans Hal.
—— —— albipennis Rond.).
—— Trachyopella villeneuvei Duda.
(—— —— melania Rond. Duda).
Thoracochaeta zosterae Hal.

58a. Periscelidae.

Microperiscelis annulata Fall.

58b. Astiidae.

Leiomyza laevigata Mg.
Asteia amoena Mg.
—— concinna Zett.

58c. Aulacogastridae.

Aulacigaster leucopeza Mg.
(—— rufitarsis Macq.).

58e. Diastatidae.

Diastata fuscula Fall.
(—— costata Mg.)
—— inornata Lw.
—— unipunctata Zett.
Campichaeta basalis Mg.
(Thryptocheta punctum Mg.)
—— obscuripennis Mg.
(—— fumipennis Mg.)

58f. Camillidae.

Camilla acutipennis Lw.
—— glabra Fall.

58g. Drosophilidae.

Stegana coleoptrata Scop.
Protostegana curvipennis Fall.
Acletoxenus formosus Lw.
Cacoxenus indagator Lw.
Amiota alboguttata Wahlb.
(Phortica).
Chymomyza costata Zett.
Parascaptomyza disticha Duda.
(Scaptomyza graminum Fall., Hendel).
Scaptomyza apicalis Hardy.
(Scaptomyzella flava Fall., Hendel).
Scaptomyza graminum Fall., Hardy.
(Scaptomyzella incana Mg., Hendel).
(—— tetrasticha Beck.)
Drosophila (s.str.) buscki Coq.
—— —— deflexa Duda.
—— —— fasciata Mg.
(—— —— melanso gaster Mg.).
(—— —— ampelophaga Lw.)
—— —— fenestrarum Fall.
—— —— funebris F.

Drosophila (s.str.) littoralis Mg.
(—— —— lugubrina Duda).
—— —— obscura Fall.
—— —— pallida Zett.
(—— —— unistriata Strobl.)
—— —— phalerata Mg.
—— —— repleta Woll.
—— —— transversa Fall.

59. Agromyzidae.

Agromyza albipennis Mg.
(Domomyza).
—— alnibetulae Hend.
(—— albitarsis Mg.)
—— ambigua Fall.
—— anthracina Mg.
—— bicophaga Her.
—— cinerascens Macq.
—— de-meyerei Hend.
—— ferruginosa v. d. W.
—— flaviceps Fall.
—— flavipennis Hend.
—— igniceps Hend.
(—— humuli Her.)
—— intermittens Beck.
—— johannae de Meij.
—— lathyri Hend.
—— lucida Hend.
—— mobilis Mg.
—— nana Mg.
—— nigripes Mg.
—— niveipennis Zett.
—— phragmitidis Hend.
—— reptans Fall.
—— rufipes Mg.
—— sanguisorbae Hend.
—— spiraeae Kalt.
—— vicifoliae Her.
Melanagromyza aeneiventris Fall.
—— cunctata Mg.
—— dettmeri Her.
——lappae Lw.
—— pulicaria Mg.
—— rostrata Hend.
(—— longilingua Hend., de Meij. in [suppl.)
—— simplicoides Hend.
Ophiomyia maura Mg.
(—— curvipalpis Zett.)
—— melandryi de Meij.
—— pinguis Fall.
Dizygomyza (Dendromyza) cambii [Hend.
(—— —— carbonaria Zett.)
—— —— errans Mg.
—— —— mallochi Hend.
—— —— posticata Mg.
—— (Cephalomyza) luteiceps Hend.
(—— —— hendeli de Meij.)
—— (Poemyza) atra Mg.
—— —— incisa Mg.
Dizygomyza (Poemyza) lateralis Mg.
—— —— muscina Mg.
—— —— pygmaea Mg.
—— (Icteromyza) capitata Zett.
—— —— geniculata Fall.
—— —— lineella Zett.
—— (Amauromyza) abnormalis Mall.
—— (Calycomyza) artemisiae Kalt.
—— —— humeralis v. Ros.
(—— —— bellidis Kalt.)
—— (Trilobomyza) flavifrons Mg.
—— —— labiatarum Hend.
—— —— verbasci Bché.
—— (Praspedomyza hilarella Zett.
—— —— monfalconensis Strobl.
—— (s. str.) bimaculata Mg.
—— —— iraeos R. D.
—— —— morosa Mg.
(—— —— riparia v. d. W.).
(—— —— laterella Zett.)
Liriomyza amoena Mg.
—— artemisicola de Meij.
—— cicerina Rond.
(—— ononidis de Meij.)
—— congesta Beck.
(—— leguminosarum de Meij.)
—— —— var. pusio de Meij.
—— equiseti de Meij.
—— eupatorii Kalt.
—— fasciata Hend.
(—— pectoralis longisetosa Mall., [de Meij.)
—— fasciola Mg.
(—— —— var. bellidis de Meij.)
—— flaveola Fall.
—— flavonotata Hal.
—— graminicola de Meij.
—— impatientis Bri.
—— lutea Mg.
—— millefolii Her.
—— orbona Mg.
—— ornata Mg.
—— perpusilla Mg.
—— puella Mg.
—— pusilla Mg.
(—— hieracii Kalt.)
——sonchi Hend.
(—— hieracii Kalt., de Meij.).
—— strigata Mg.
—— tanaceti de Meij.
—— taraxaci Her.
(—— hieracii Kalt., de Meij.).
—— valerianae Hend.
(—— fasciola Mg. de Meij.).
—— xanthaspis Lw.
(Haplomyza xanthaspis Lw.).
Phytagromyza anteposita Strobl.
—— discrepans v. d. W.
—— flavocingulata Strobl.
—— hendeliana Her.
(—— harlemensis Hend.)

(Phytagromyza lonicerae Kalt. ap [Hendel de Meij.).
—— lucens de Meij.
—— orphana Hend.
—— populi Kalt.
—— tridentata Lw.
—— tripolii de Meij.
—— trivittata Lw.
—— xylostei R. D.
(—— luteoscutellata de Meij.)
Pseudonapomyza atra Mg.
Phytomyza (Napomyza) annulipes [Mg.
—— —— elegans Mg.
—— —— glechomae Kalt.
—— —— lateralis Fall.
—— —— nigriceps v. d. W.
—— —— xylostei Kalt.
—— (s. str.) aconiti Hend.
—— —— adjuncta Her.
—— —— affinis Fall.
—— —— agromyzina Mg.
—— —— albipennis Fall.
—— —— angelicae Kalt.
—— —— angelicivora Her.
—— —— anthrisci Hend.
—— —— aquilegiae Hardy
—— —— atricornis Mg.
—— —— brischkei Hend.
—— —— brunnipes Bri.
—— —— chaerophylli. Kalt.
—— —— cineracea Hend.
—— —— cirsii Hend.
—— —— conyzae Hend.
—— —— crassiseta Zett.
—— —— cytisi Bri.
—— —— eupatorii Hend.
—— —— evanescens Hend.
—— —— flavofemorata Strobl.
—— —— flavicornis Fall.
(—— —— pratensis de Meij.).
—— —— gymnostoma Lw.
—— —— heteroneura Hend.
—— —— ilicis Curt.
—— —— jacobaeae de Meij.
—— —— lappae Gour.
—— —— matricariae Hend.
—— —— melampyri Her.
(—— —— flavofemorata Strobl. ap. [de Meij.).
—— —— milii Kalt.
—— —— minuscula Gour.
—— —— nigra Mg.
—— —— nigripennis Fall.
—— —— nigritella Zett.
—— —— obscurella Fall.
—— —— orobanchia Kalt.
—— —— pastinacae Hend.
—— —— periclymeni de Meij.
—— —— pimpinellae Hend.
—— —— plantaginis R. D.
—— —— primulae R. D.

Phytomyza (s. tr.) pubicornis Hend.
—— —— ramosa Hend.
—— —— ranunculi Schrk.
(—— —— praecox Mg.).
(—— —— flavoscutellata Fall.).
—— —— rufipes Mg.
—— —— senecionis Hend.
(—— —— lappae Gour. de Meij.).
—— —— sonchi R. D.
(—— —— lampsanae Her.).
—— —— sphondylii R. D.
—— —— tenella Mg.
—— —— thysselini Hend.
—— —— varipes Macq.
—— —— vitalbae Kalt.
Cerodonta affinis Fall.
(Ceratomyza)
—— atronitens Hend.
(Haplomyza atronitens Hend.)
—— biseta Hend.
(Dirygomyza biseta Hend. vroeger).
—— denticornis Panz.
—— —— var. nigroscutellata Strobl.
—— fulvipes Mg.

60a. Milichiidae.

Milichiniinae.
Milichia ludens Wahlb.
Madizinae.
Phyllomyza securicornis Fall.
—— (Neophyllomyza) longipalpis [Schm.
Madiza glabra Fall.
Leptometopa latipes Mg.
(Hypaspistomyia)
—— niveipennis Strobl.
(—— simplicipes Beck.)
Desmometopa sordidum Fall.
Carninae.
Meoneura lacteipennis Fall.
—— obscurella Fall.
—— vagans Fall.
Carnus hemapterus Nitzsch.

60b. Odiniidae.

Odinia maculata Mg.

60c. Braulidae.

Braula coeca Nitzsch.

61. Chloropidae.

Elachiptera bimaculata Lw.
—— brevipennis Mg.
—— capreola Curt.
(—— aterrima Strobl.).
—— cornuta Fall.
—— —— var. rufifrons Duda.
Aspistyla plumigera Mg.
Aphanotrigonum trilineatum Mg.

Tricimba cincta Zett.
—— lineella Fall.
Conioscinella albipalpis Mg.
—— albisetosa Duda var.
[hollandica Duda.
—— brachyptera Zett.
—— frontella Fall.
—— —— var. flavifrons Duda.
—— halophila Duda.
(—— pratensis Mg., de Meij.).
—— kerteszi Beck.
—— longirostris Lw.
—— meyerei Duda.
—— minutissima Strobl.
—— pumilio Zett.
(Siphonella pumilionis Bjerk.).
—— —— var. flavella Zett.
—— sordidissima Strobl.
Eribolus hungaricus Beck.
(Oscinella plana de Meij.).
—— slesvicensis Beck.
—— sudeticus Beck.
(Oscinella leptomyzoides de Meij.).
Dicraeus ingratus Lw.
—— pallidiventris Macq.
—— styriacus Strobl.
—— xanthopygus Strobl.
Siphonella oscinina Fall.
Calamoncosis aprica Mg.
—— duinensis Strobl.
—— minima Strobl.
(—— nigricornis v. Ros.).
—— tomentosa Beck.
(—— rufitarsis Lw.).
Lipara lucens Mg.
Hapleginella laevifrons Lw.
Oscinosoma cognata Mg.
Oscinella anthracina Mg.
—— frit L.
—— —— var. atricella Zett.
(—— nitidissima Mg.).
—— gracilior de Meij.
—— maura Fall.
—— —— var. albiseta Mg.
Microneurum aeneum Macq.
Polyodaspis ruficornis Macq.
Goniopsita palposa Fall.
Camarota curvinervis Latr.
(—— flavitarsis Mg.).
Platycephala planifrons F.
—— umbraculata F.
Meromyza pratorum Mg.
—— saltatrix L.
—— —— var. femorata Macq.
—— —— var. nigriventris Macq.
—— —— var. variegata Mg.
Eurina calva Egg.
—— lurida Mg.
Haplegis diadema Mg.
—— flavitarsis Mg.
—— tarsata Fall.

Lasiosina albipila Lw.
—— approximatonervis Zett.
—— cinctipes Mg.
Diplozona messoria Fall.
Chlorops (Melanum) laterale Hal.
—— (Eutropha) fulvifrons Hal.
—— (Cetema) cereris Fall.
—— —— elongata Mg.
—— —— myopina Lw.
—— (Chlorops) fasciata Mg.
(—— —— dasycera Lw.).
(—— —— horrida Beck.).
—— (Oscinis) brevimana Lw.
(—— —— fulviceps v. Ros. ap.
[Beck.).
—— —— brunnipes Zett.
—— —— calceata Mg.
—— —— geminata Mg.
—— —— gracilis Mg.
—— —— hypostigma Mg.
—— —— meigeni Lw.
(—— —— nasuta Schrk.).
—— —— novakii Strobl.
—— —— planifrons Lw.
—— —— —— var. triangularis
—— —— pumilionis Bjerk. [Beck.
(—— —— taeniopus Mg.).
—— —— ringens Lw.
—— —— rufina Zett.
—— —— scalaris Mg.
—— —— —— var. lineolina
[Duda i. litt.
—— —— serena Lw.
—— —— speciosa Mg.
—— —— troglodytes Zett.
—— (Parectecephala) longicornis
[Zett.
—— (Anthracophaga) frontosa Mg.
Chloropisca glabra Mg.
Thaumatomyia notata Mg.
—— obscurella Zett.
—— rufa Macq.

62. Cordyluridae.

(Scatomyzidae).
Cordylura ciliata Mg.
—— picipes Mg.
(—— —— (biseta Lw.).
—— pubera L.
—— pudica Mg.
Paralleloma albipes Fall.
Chylizosoma medium Beck.
—— vittatum Mg.
Phrosia albilabris Fall.
Cnemopogon apicalis Mg.
Leptopa filiformis Zett.
Megophthalma pallidum Fall.
Amaurosoma fasciatum Mg.
—— flavipes Fall.
—— leucochaetum de Meij.
—— tibiellum Zett.

Scopeuma decipiens Hal.
(Scatophaga).
—— inquinatum Mg.
—— lutarium F.
—— maculipes Zett.
—— scybalarium L.
—— semiatrum de Meij.
—— squalidum Mg.
—— stercorarium L.
—— —— —— var. merdarium F.
—— suillum Mg.
(—— spurcum F.).
Scatomyza litorea Fall.
Coniosternum obscurum Fall.
Ceratinostoma ostiorum Hal.
Norellisoma armipes Mg.
(—— flavicauda Mg.).
—— lituratum Mg.
—— nervosum Mg.
—— spinimanum Mg.
Hydromyza livens Fall.
Trichopalpus fraternus Mg.
—— punctipes Mg.
Spathiophora fascipes Beck.
(—— falleni Schin.).
Clidogastra nigrita Fall.
—— nitida v. d. W.
Gymnomera tarsea Fall.

63. Anthomyidae.

Musca corvina F.
—— domestica L.
—— tempestiva Fall.
—— vitripennis Mg.
Cryptolucilia caesarion Mg.
—— cornicina F.
Dasyphora cyanella Mg.
Pyrellia cadaverina L.
—— serena Mg.
(—— aenea Zett.).
Myiospila meditabunda F.
Graphomyia maculata Scop.
Mesembrina meridiana L.
Muscina assimilis Fall.
—— pabulorum Fall.
—— pascuorum Mg.
—— stabulans Fall.
Morellia aenescens R. D.
—— hortorum Fall.
—— simplex Lw.
Stomoxys calcitrans L.
Haematobia stimulans Mg.
Lyperosia irritans L.
Polietes albolineata Fall.
—— lardaria F.
Phaonia basalis Zett.
—— cincta Zett.
—— errans Mg.
—— erratica Fall.
—— fuscata Fall.
—— goberti Mik.
—— gracilis Stein.
—— incana Wied.
—— laeta Fall.
—— magnicornis Zett.
—— pallida F.
—— palpata Stein.
(—— trigonalis in N. N.).
—— perdita Mg.
—— querceti Bché.
—— rufipalpis Macq.
—— scutellaris Fall.
—— serva Mg.
—— signata Mg.
—— trimaculata Bché.
—— vagans Fall.
—— variegata Mg.
—— vittifera Zett.
(—— trigonospila Czerny).
Lasiops foveolatus Zett.
—— semicinereus Wied.
Alloeostylus diaphanus Wied.
Drymeia hamata Fall.
Acanthiptera inanis Fall.
Dialyta atriceps Lw.
Hydrotaea albipuncta Zett.
—— armipes Fall.
—— ciliata F.
—— cinerea R. D.
—— cyrtoneurina Zett.
—— dentipes F.
—— glabricula Fall.
—— irritans Fall.
— meteorica L.
—— occulta Mg.
—— palaestrica Mg.
—— velutina R. D.
Ophyra anthrax Mg.
—— leucostoma Wied.
Fannia aerea Zett.
—— armata Mg.
—— atripes Stein.
—— canicularis L.
—— carbonaria Mg.
—— fuscula Fall.
—— genualis Stein.
—— glaucescens Zett.
—— hamata Macq.
—— incisurata Zett.
—— manicata Mg.
—— mutica Zett.
—— pallitibia Rond.
—— polychaeta Stein.
—— pretiosa Schin.
—— scalaris F.
—— serena Fall.
—— similis Stein.
—— sociella Zett.
—— tuberculata Zett.
Platycoenosia miki Strobl.
Eginia ocypterata Mg.
Azelia aterrima Mg.

Azelia cilipes Hal.
—— macquarti Stg.
—— triquetra Wied.
(—— zetterstedti Rond.).
Hebecnema nigricolor Fall.
—— umbratica Mg.
—— vespertina Fall.
Mydaea ancilla Mg.
—— pagana F.
—— tincta Zett.
—— urbana Mg.
Helina anceps Zett.
(—— communis R. D. in N. N.).
—— atripes Meade.
—— calceata Rond.
—— depuncta Fall.
—— duplicata Mg.
—— flagripes Rond.
—— impuncta Fall.
—— intermedia Vill.
—— latitarsis Ringd.
—— lucorum Fall.
—— obscurata Mg.
—— pertusa Mg.
—— protuberans Zett.
(—— exul Zett.).
—— pubescens Stein.
—— quadrimaculata Fall.
—— quadrinotata Mg.
—— quadrum F.
—— setiventris Ringd.
(—— duplaris Zett. Stein).
—— uliginosa Fall.
—— vanderwulpi Schnabl.
Enoplopteryx ciliatocosta Zett.
Limnophora (Calliophrys) exuta [Kow.
—— —— riparia Fall.
—— (Limnophora) maculosa Mg.
—— —— notata Fall.
—— (Pseudolimnophora) triangula [Fall.
—— (Spilogona) aerea Fall.
—— —— biseriata Stein.
—— —— contractifrons Zett.
—— —— marina Collin.
(—— —— depressiuscula Zett.).
—— —— dispar Fall.
—— —— nupta Zett.
(—— —— sororcula Zett.).
—— —— surda Zett.
—— —— veterrima Zett.
(—— —— signata Stein).
—— (Gymnodia) humilis Zett.
(—— —— septemnotata Stein [nec Zett.).
Lispa caesia Mg.
—— consanguinea Lw.
—— hydromyzina Fall.
—— litorea Fall.
(—— pilosa Lw. in N. N.).
Lispa loewi Ringd.
(—— litorea in N. N.).
—— nana Macq.
—— pygmaea Fall.
—— tentaculata de G.
—— uliginosa Fall.
Acyglossa atramentaria Mg.
Eustalomyia hilaris Fall.
Hydrophoria conica Wied.
—— linogrisea Mg.
—— ruralis Mg.
Acroptena ambigua Fall.
—— caudata Zett.
—— divisa Mg.
Pegomyza praepotens Wied.
—— schineri Schnabl.
(—— puella Schin.).
—— virginea Mg.
Pegomyia albimargo Pand.
—— bicolor Wied.
—— esuriens Mg.
—— flavipes Fall.
—— flavisquama Stein.
—— fulgens Mg.
—— geniculata Bché.
(—— ephippium Zett.).
—— genupuncta Stein.
—— hyoscyami Panz.
—— —— var. betae Curt.
—— —— var. chenopodii Rond.
—— incisiva Stein.
—— nigritarsis Zett.
—— pallida Stein.
—— pallipes Stein.
—— rufina Fall.
—— rufipes Fall.
—— setaria Mg.
—— socia Fall.
—— tenera Zett.
—— transversa Fall.
(—— winthemi in N. N.).
—— univittata v. Ros.
—— vittigera Zett.
—— winthemi Mg.
(—— latitarsis Zett.).
Hylemyia coactata Fall.
—— lasciva Zett.
—— nigrimana Mg.
—— strigosa F.
—— variata Fall.
Chortophila (Flavena) [criniventris Zett.
—— —— lavata Boh.
—— (Delia) cardui Mg.
—— —— brunnescens Zett.
—— (Egeria) brassicae Bché.
—— —— brunneilina Zett.
—— —— cinerea Fall.
—— —— discreta Mg.
—— —— floralis Fall.
—— —— gnava Mg.

Chortsphila (Egeria) lamelliseta Stein.
—— —— latipennis Zett.
—— —— lineata Stein.
—— —— pilipyga Vill.
—— —— pullula Zett.
—— —— rubicola End.
—— —— seneciella Meade.
—— —— signata Bri.
—— —— varicolor Mg.
(—— —— trapezina Zett.).
—— (Tricharia) florilega Zett.
(—— —— trichodactyla Rond.).
—— —— parcepilosa Vill.
—— (Crinura) albula Fall.
—— —— antiqua Mg.
—— —— platura Mg.
(—— —— fusciceps Zett.).
(—— —— florilega Zett.).
(—— —— cilicrura Rd.).
—— (Thrixina) candens Zett.
—— —— fugax Mg.
—— —— octoguttata Zett.
—— (Nupedia) dissecta Mg.
—— —— intersecta Mg.
Pycnoglossa cinerosa Zett.
Phorbia genitalis Schn.
(—— unipila Karl).
(—— curvicauda Zett.).
—— penicillaris Stein.
—— securis Tiens.
(—— genitalis ap. Karl).
—— sepia Mg.
Heterostylus pratensis Mg.
Paregle aestiva Mg.
—— cinerella Fall.
—— radicum L.
—— spreta Mg.
Egle muscaria F.
—— parva R. D.
Hammomyia albiseta v. Ros.
—— grisea Fall.
Hylephila personata Collin.
(—— obtusa Zett. de Meij. in suppl.).
Anthomyia pluvialis L.
(—— procellaris R. D.).
Calythea albicinacta Fall.
—— pratincola Panz.
Prosalpia billbergi Zett.
Mycophaga fungorum de G.
Myopina reflexa R. D.
Fucellia maritima Hal.
Chirosia albitarsis Zett.
—— crassiseta Stein.
—— parvicornis Zett.
Lispocephala alma Mg.
—— brachialis Rond.
—— erythrocera R. D.
(—— lacteipennis Zett.).
—— verna F.
Chelisia monilis Mg.
Macrorchis meditata Fall.
Dexiopsis lacteipennis Zett.
—— litoralis Zett.
Limnospila albifrons Zett.
Spanochaeta dorsalis v. Ros.
(—— longitarsis Stein).
Atherigona varia Mg.
Allognota agromyzina Fall.
Coenosia albatella Zett.
—— ambulans Mg.
—— atra Mg.
—— bilineella Zett.
—— decipiens Mg.
—— geniculata Fall.
—— humilis Mg.
—— intermedia Fall.
—— means Mg.
—— mollicula Fall.
—— perpusilla Mg.
—— pumila Fall.
—— pygmaea Zett.
—— rufipalpis Mg.
(—— murina in N. N.).
—— salinarum Stein.
—— sexnotata Mg.
—— tigrina F.
—— tricolor Zett.
Schoenomyza litorella Fall.

64. Tachinidae.

Servillia ursina Mg.
Larvaevora grossa L.
(Echinomyia).
—— fera L.
—— magnicornis Zett.
Fabriciella ferox Panz.
Peletieria nigricornis Mg.
(—— prompta Mg.).
(—— tessellata Schin.).
Cuphocera ruficornis Macq.
Linnaemyia compta Fall.
(Micropalpus).
—— haemorrhoidalis Fall.
—— pudica Rond.
—— vulpina Fall.
Ernestia rudis Fall.
Platychira conjugata Zett.
—— connivens Zett.
—— consobrina Mg.
(—— vivida Zett.).
—— radicum L.
Eurythia caesia Fall.
Meriania puparum F.
Nemoraea pellucida Mg.
Eversmannia ruficauda Zett.
Lypha dubia Fall.
Lydina aenea Mg.
Sturmia inconspicua Mg.
—— scutellata R. D.
Winthemia amoena Mg.
—— quadripustulata F.
—— xanthogastra Rnd. Stein.

Carcelia excisa Fall.
—— flavicans Macq.
—— gnava Mg.
—— lucorum Mg.
—— phalaenaria Rnd.
Gymnochaeta viridis Fall.
Aetylia R. D. agnata Rond.
(Exorista)
—— affinis Fall.
(—— polychaeta Macq.)
—— bonsdorffi Zett.
(—— arundinacea Stein.)
—— confinis Fall.
—— fimbriata Mg.
—— glauca Mg.
(Zenillia stulta Zett. Pand.)
—— hortulana Mg.
(—— ingens Stein, Lundb.)
—— libatrix Panz.
—— lota Mg.
—— mitis Mg.
—— westermanni Zett.
Nemorilla floralis Fall.
(—— maculosa Mg.)
(—— notabilis Mg.)
Bavaria jucunda Mg.
Megalochaeta conspersa Mg.
Epicampocera succincta Mg.
Anoxycampta hirta Big.
Phryxe nemea Mg.
—— vulgaris Fall.
Masicera sylvatica Fall.
Lydella grisescens R.D.
(—— senilis Mg.)
Ceromasia nigripes Fall.
—— sordidisquama Zett.
—— stabulans Mg.
Bactromyia aurulenta Mg.
(Discochaeta evonymella Ratz.).
Prosopaea nigricans Egg.
Bessa selecta Mg.
(Ptychomyia).
Staurochaeta vibrissata Rond.
Erynnia nitida R. D.
Frontina laeta Mg.
Goedartia praecox Mg.
(Campylochaeta obscura Fall. in [Suppl.)
Gaedia connexa Mg.
Phorinia aurifrons R.D.
Diplostichus janithrix Hart.
(—— tenthredinum B.B.)
Compsilura concinnata Mg.
Pales pavida Mg.
Phorocera agilis R.D. Stein.
(Parasetigena segregata auct.)
—— erecta Coq.
Bothria frontosa Mg.
(—— pascuorum Rond.)
Chaetogena assimilis Fall.
—— vernalis R.D.
(Chaetogena caesifrons Macq. Vill.).
Meigenia mutabilis Fall.
(—— bisignata Mg.)
(—— floralis Mg.).
Viviania cinerea Fall.
Exorista larvarum L.
(Tachina).
—— rustica Mg.
(—— erucarum Rond.).
Tricholyga sorbillans Wied.
(—— grandis Zett.).
Stomatomyia acuminata Rnd.
(Deuterammonia glabriventris [v. d.W.).
Perichaeta unicolor Fall.
Cyzenis (Monochaeta) albicans Fall.
Pseudopachystylum goniaeoides Zett.
Baumhaueria goniaeformis Mg.
Histochaeta marmorata F.
Germaria ruficeps Fall.
Atractochaeta angustata Zett.
Gonia divisa Mg.
—— fasciata Mg.
—— ornata Mg.
Plagia elata Mg.
Voria ruralis Fall.
—— trepida Mg.
(—— curvinervis Zett.).
(—— ruficornis Zett.).
Anachaetopsis ocypterina Zett.
Wagneria carbonaria Panz.
—— latifrons Zett.
—— nigrans Mg.
Oebalia cylindrica Fall.
(Ptychoneura).
—— melaleuca Mg.
(—— rufitarsis Mg.).
Rhacodineura antiqua Mg.
Crocuta cristata F.
(Bucentes).
—— geniculata de G.
—— maculata Staeg.
Neaera albicollis Mg.
—— laticornis Mg.
Bigonichaeta setipennis Fall.
Actia bicolor Mg.
—— crassicornis Mg.
—— fissicornis Strobl.
—— lamia Mg.
(—— frontalis Macq.).
—— nudibasis Stein.
—— pilipennis Fall.
—— silacea Mg.
Helocera delecta Mg.
Phytomyptera nigrina Mg.
Eurythea scutellaris R. D.
(Discochaetae hyponomeutae Rond.).
Neaeropsis incurva Zett.
Elodia cloacellae Kram.
(Arrhinomyia).
—— tragica Mg.

Arrhinomyia innoxia Mg.
(Apatelia separata Mg. Baer).
(Degeeria separata Mg. in N. N.).
Trichoparia blanda Fall.
—— decorata Zett.
—— seria Mg.
Peteina erinaceus F.
Degeeria collaris Fall.
—— luctuosa Mg.
Vibrissina turrita Mg.
(—— demissa Mg.).
Mintho rufiventris Fall.
(—— praeceps Scop.).
Thelaira nigripes F.
Phyllomyia volvulus F.
Macquartia dispar Fall.
—— grisea Fall.
—— nitida Zett.
(—— chalconota Mg.).
(—— tenebricosa Mg.).
—— occlusa Rond.
Ptilops chalybeata Mg.
—— nigrita Fall.
Anthracomyia melanoptera Fall.
Loewia foeda Mg.
—— setibarba Egg.
Pelatachina tibialis Fall.
Blepharomyia amplicornis Zett.
Zophomyia temula Scop.
Demoticus plebeius Fall.
Bithia spreta Mg.
Aphria longirostris Mg.
Leskia aurea Mg.
Myiobia fuscana R. D.
(—— fenestrata Mg.).
—— inanis Fall.
Eriothrix prolixa Mg.
(Rhynchista).
—— rufomaculata de G.
Ocypterula pusilla Mg.
Cylindromyia brassicaria F.
(Ocyptera).
Trixa grisea Mg.
Phyto melanocephala Mg.
Melanophora roralis L.
Plesina maculata Fall.
Frauenfeldia trilineata Mg.
(—— rubrinosa Mg.).
Stevenia atramentaria Mg.
(—— melania Mg.).
Rhinophora lepida Mg.
Sarcophaga carnaria L.
—— dissimilis Mg.
—— filia Rond.
(—— juvenis Rond.).
—— frenata Pand.
(—— cruentata Mg. in N. N.).
—— haematodes Mg.
—— haemorrhoidalis Fall.
—— laticornis Mg.
—— melanura Mg.
(Sarcophaga cruentata Mg. p. p.).
—— nigriventris Mg.
—— noverca Rond.
—— offuscata Schin.
—— privigna Pand.
(—— striata Mg. Vill.).
—— pumila Mg.
—— setipennis Rond.
—— sinuata Mg.
—— tuberosa Pand. var. [harpax Pand.
—— vagans Mg.
—— vulnerata Schin.
Blaesoxipha lineata Fall.
Agria affinis Fall.
Helicobosca muscaria Mg.
Brachycoma devia Fall.
Sarcophila latifrons Fall.
Nyctia halterata Panz.
Morinia fimbriata Mg.
—— nana Mg.
Gastrolepta anthracina Mg.
(Medoria).
—— pullula Zett.
Angioneura acerba Mg.
Miltogramma (subg. Acanthothecum) [testaceifrons v. Ros.
(—— pilitarse Rond.).
—— (Stephanodactylum) [punctatum Mg.
—— (s.str.) oestraceum Fall.
Setulia grisea Mg.
Senotainia (s.str.) conica Fall.
Hilarella dira R. D.
—— hilarella Zett.
Taxigramma (Paragusia) [elegantulum Zett.
Metopia campestris Fall.
—— leucocephala Rossi.
Phrosinella nasuta Mg.
Heteropterina heteroneura Mg.
—— multipunctata Rond.
Rhaphiochaeta breviseta Zett.
Macronychia agrestis Fall.
—— griseola Fall.
—— polyodon Mg.
Estheria costata Mg.
Dexiosoma caninum F.
Dexia rustica F.
—— vacua Fall.
Prosena siberita F.
Dinera grisescens Fall.
Myiocera carinifrons Fall.
—— ferina Fall.
Gymnopeza albipennis Zett.
(Freraea denudata Zett.).
Weberia pseudofunesta Vill.
(—— curvicauda Fall.).
Phania vittata Mg.
Leucostoma simplex Fall.
Cinochira atra Zett.

Dionaea digramma Mg.
Rondania cucullata R. D.
(—— dimidiata Mg.).
—— dispar Duf.
Syntomogaster exigua Mg.
Catharosia pygmaea Fall.
Acemyia acuticornis Mg.
Gymnosoma rotundatum L.
Cystogaster globosa F.
—— nitens Mg.
Clytiomyia continua Panz.
—— pellucens Fall.
Alophora obesa F.
—— —— var. fascipennis Girschn.
—— —— var. latipennis Gischn.
—— —— var. nebulosa Girschn.
—— pusilla Mg.
Pollenia atramentaria Mg.
—— rudis F.
—— varia Mg.
(—— occlusa Egg.).
—— vespillo F.
Phormia terrae novae R.D.
(Protophormia groenlandica Zett.).
(—— coerulea R. D., Stein).
—— regina Mg.
Protocalliphora caerulea R. D., [Bezzi, Séguy.
(—— sordida Zett.).
Lucilia ampullacea Vill.
(—— flavipennis Kram. nec Macq.).
—— illustris Mg. Collin, Séguy.
(—— simulatrix Pand.).
—— caesar L.
—— sericata Mg.
—— silvarum Mg.
Calliphora erythrocephala Mg.
—— vomitoria L.
Onesia aculeata Pand.
(Onesia agilis Mg.).
—— biseta Vill.
—— coerulea Mg.
(—— cognata Mg.).
—— gentilis Mg.
—— obsoleta Mg.
—— sepulchralis Mg.
Cynomyia mortuorum L.

Oestridae.

Oestrus ovis L.
Hypoderma bovis L.
—— lineatum Vill.
Pharyngomyia picta Mg.

Gastrophilidae.

Gastrophilus haemorrhoidalis F.
(Gastrus).
Gastrophilus intestinalis de G.
(—— equi Clark).
—— pecorum F.
—— veterinus Clark.
(—— nasalis L.).

65. Hippoboscidae.

Hippobosca equina L.
Olfersia ardeae Macq.
Ornithomyia avicularia L.
—— fringillina Curt.
Ornitheza metallica Schin.
Stenopteryx hirundinis L.
Crataerrhina pallida Latr.
Lipoptena cervi L.
Melophagus ovinus L.

66. Nycteribiidae.

Listropodia latreillei Leach.
(—— blasii Kol.).
Basilia nattereri Kol.

REGISTER.